



WISKUNDE

Graad 9

Boek 1

KABV

Leerderboek

sasol
inzalo
foundation



UKUQONDA
i n s t i t u t e

Ontwikkel en gefinansier as 'n voortgesette projek van die Sasol Inzalo Stigting, in samewerking met die Ukuqonda Instituut.

Gepubliseer deur The Ukuqonda Institute
Nealestraat 9, Rietondale 0084
Geregistreer as Titel 21-maatskappy, registrasienommer 2006/026363/08
Openbare Bevoordelingsorganisasie, PBO-no. 930035134
Webwerf: <http://www.ukuqonda.org.za>

Eerste publikasie in 2013
© 2013. Kopiereg op die werk is in die uitgewer gevestig.
Kopiereg op die teks is gevestig in die bydraers.

ISBN: 978-1-920705-40-4

Hierdie boek is ontwikkel in samewerking met die Departement van Basiese
Onderwys van Suid-Afrika, met finansiering van die Sasol Inzalo Stigting.

Medewerkers:

Piet Human, Erna Lampen, Marthinus de Jager, Louise Keegan, Paul van Koersveld,
Nathi Makae, Enoch Masemola, Therine van Niekerk, Alwyn Olivier, Cerenus Pfeiffer,
Renate Röhrs, Dirk Wessels, Herholdt Bezuidenhout

Illustrasies en grafieka:

Leonora van Staden; Lisa Steyn Illustration; Zhandre Stark, Lebone Publishing Services
Rekenaargrafieka op die tweede bladsye van die *Leerderboek*-hoofstukke: Piet Human

Voorbladillustrasie: Leonora van Staden

Teksontwerp: Mike Schramm

Uitleg en setwerk: Lebone Publishing Services

Gedruk deur: [printer name and address]

KOPIEREGKENNISGEWING

Jou reg om hierdie boek wetlik te kopieer

Hierdie boek word gepubliseer onder lisensiëring van 'n Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Lisensie (CC BY-NC).

Jy mag en word aangemoedig om hierdie boek vrylik te kopieer. Jy kan dit soveel keer as wat jy wil fotostateer, uitdruk en versprei.

Jy kan dit aflaai op enige elektroniese toestel, dit per epos versprei en op jou webblad laai. Jy mag ook die teks en illustrasies aanpas, op voorwaarde dat jy aan die kopiereghouers erkenning gee (“erken die oorspronklike werk”).

Beperkings: Jy mag nie kopieë van hierdie boek maak vir die doel van winsbejag nie. Dit geld vir gedrukte, elektroniese en webbladgebaseerde kopieë van hierdie boek, of enige deel van hierdie boek.

Vir meer inligting oor lisensiëring by die Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0), besoek <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>

 Behalwe indien anders vermeld, is hierdie werk gelisensieer onder <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>

Inhoudsopgawe

Kwartaal 1

Hoofstuk 1:

Telgetalle 1

Hoofstuk 2:

Heelgetalle..... 27

Hoofstuk 3:

Breuke 39

Hoofstuk 4:

Die desimale notasie vir breuke 57

Hoofstuk 5:

Eksponente 71

Hoofstuk 6:

Patrone 85

Hoofstuk 7:

Funksies en verbande 99

Hoofstuk 8:

Algebraïese uitdrukkings 115

Hoofstuk 9:

Vergelykings..... 143

Kwartaal 1: Hersiening en assessering 157

Kwartaal 2

Hoofstuk 10:

Konstruksie van meetkundige figure 175

Hoofstuk 11:

Meetkunde van 2D-figure 197

Hoofstuk 12:

Meetkunde van reguit lyne 219

Hoofstuk 13:

Die stelling van Pythagoras 235

Hoofstuk 14:

Oppervlakte en omtrek van 2D-figure 249


Kwartaal 2: Hersiening en assessering 267

HOOFSTUK 1

Telgetalle

In hierdie hoofstuk gaan jy met verskillende soorte getalle werk wat ons gebruik om mee te tel en te meet, om vergelykings op te los asook vir baie ander doeleindes.

1.1	Eienskappe van getalle	3
1.2	Berekeninge met telgetalle	7
1.3	Veelvoude en faktore	16
1.4	Probleemoplossing: verhouding, koers (tempo) en eweredigheid.....	18
1.5	Probleemoplossing in finansiële kontekste	20



				99	100	101	102	103
				90	91	92	93	94
				81	82	83	84	85
				72	73	74	75	76
				63	64	65	66	67
				54	55	56	57	58
				45	46	47	48	49
				36	37	38	39	40
				27	28	29	30	31
				18	19	20	21	22
				9	10	11	12	13
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
-13	-12	-11	-10	-9				
-22	-21	-20	-19	-18				
-31	-30	-29	-28	-27				
-40	-39	-38	-37	-36				
-49	-48	-47	-46	-45				
-58	-57	-56	-55	-54				
-67	-66	-65	-64	-63				
-76	-75	-74	-73	-72				
-85	-84	-83	-82	-81				
-94	-93	-92	-91	-90				
-103	-102	-101	-100	-99				
-112	-111	-110	-109	-108				

1 Telgetalle

1.1 Eienskappe van getalle

VERSKILLENDE SOORTE GETALLE

Die natuurlike getalle

Die getalle wat ons gebruik om te tel word **natuurlike getalle** genoem:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Natuurlike getalle het die volgende eienskappe:

As jy twee of meer natuurlike getalle optel, kry jy weer 'n natuurlike getal.

As jy twee of meer natuurlike getalle vermenigvuldig, kry jy weer 'n natuurlike getal.

Wiskundiges beskryf dit deur te sê: die stelsel van natuurlike getalle is **geslote vir optel en vermenigvuldiging**.

As jy 'n natuurlike getal van 'n ander natuurlike getal aftrek, is die antwoord egter nie altyd weer 'n natuurlike getal nie. Daar is byvoorbeeld nie 'n natuurlike getal wat die antwoord op $5 - 20$ gee nie.

Ook wanneer 'n natuurlike getal deur 'n ander natuurlike getal gedeel word, is die antwoord nie altyd weer 'n natuurlike getal nie. Daar is byvoorbeeld nie 'n natuurlike getal wat die antwoord op $10 \div 3$ gee nie.

As jy met natuurlike getalle aftrek of deel is die antwoorde nie altyd natuurlike getalle nie.

Die stelsel van natuurlike getalle is **nie geslote vir aftrek of deling nie**.

- Is daar 'n kleinste natuurlike getal, dit wil sê 'n natuurlike getal wat kleiner as alle ander natuurlike getalle is? Indien wel, wat is dit?
 - Is daar 'n grootste natuurlike getal, dit wil sê 'n natuurlike getal wat groter as alle ander natuurlike getalle is? Indien wel, wat is dit?
- Sê in elk van die volgende gevalle of die antwoord 'n natuurlike getal is of nie.
 - $100 + 400$
 - $100 - 400$
 - 100×400
 - $100 \div 400$

Die telgetalle

Alhoewel ons 0 nie gebruik om te tel nie, het ons dit nodig om getalle te skryf. Sonder 0 sou ons 'n spesiale simbool vir 10, alle veelvoude van 10 en 'n paar ander getalle nodig hê, byvoorbeeld vir al die getalle wat in die geel selle (blokkies) in hierdie tabel hoort.

	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	81	82	83	84	85	86	87	88	89
	91	92	93	94	95	96	97	98	99
	111	112	113	114	115	116	117	118	119

Die natuurlike getalle gekombineer met 0 word die stelsel van **telgetalle** genoem.

As jy met natuurlike getalle werk en twee getalle bymekaartel, sal die antwoord altyd anders wees as enigeen van die twee getalle wat jy bymekaargetel het. Byvoorbeeld: $21 + 25 = 46$ en $24 + 1 = 25$. As jy met telgetalle werk, met ander woorde 0 ingesluit, is dit nie die geval nie. As 0 by 'n getal getel word, is die antwoord steeds die getal waarmee jy begin het: $24 + 0 = 24$.

Om hierdie rede word 0 die **identiteitselement vir optel** genoem. In die versameling natuurlike getalle is daar nie 'n identiteitselement vir optel nie.

3. Is daar 'n identiteitselement vir vermenigvuldiging in die telgetalle? Verduidelik.

.....

4. (a) Wat is die kleinste natuurlike getal?

(b) Wat is die kleinste telgetal?

Die heelgetalle

In die versameling telgetalle is daar nie 'n antwoord beskikbaar as jy 'n getal aftrek van 'n getal wat kleiner as daardie getal self is nie. Daar is byvoorbeeld nie 'n telgetal wat die antwoord vir $5 - 8$ is nie. Daar is wel 'n antwoord hiervoor in die stelsel van heelgetalle.

$5 - 8 = -3$. Die getal -3 word as “negatief 3” of “minus 3” gelees.

Die telgetalle begin met 0 en brei in een rigting uit:

0 1 2 3 4 5 6 → → →

Die heelgetalle brei in albei rigtings uit:

..... ← ← ← -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 → → →

Alle telgetalle is ook heelgetalle. Die versameling telgetalle maak deel uit van die versameling heelgetalle. Daar is 'n ooreenstemmende negatiewe getal vir elke telgetal (behalwe vir die getal 0). Die negatiewe getal -5 stem ooreen met die telgetal 5 en die negatiewe getal -120 stem ooreen met die telgetal 120.

In die versameling heelgetalle kan die som van twee getalle 0 wees, byvoorbeeld $20 + (-20) = 0$ en $135 + (-135) = 0$.

20 en -20 word **optellingsinverses** (of additiewe inverses) van mekaar genoem.


5. Bereken die volgende sonder om 'n sakrekenaar te gebruik.

- (a) $100 - 165$ (b) $300 - 700$


6. Jy mag 'n sakrekenaar gebruik om die volgende te bereken:

- (a) $123 - 765$ (b) $385 - 723$

Die rasionale getalle



7. Vyf mense verdeel 12 blokke sjokolade gelykop tussen hulle.

- (a) Sal elke persoon meer of minder as twee volle blokke sjokolade kry?
- (b) Kan elke persoon nog 'n helfte van 'n blok kry?
- (c) Hoeveel meer as twee volle blokke kan elkeen kry as die twee oorblywende blokke gedeel word soos hier gewys is? 

-
- (d) Sal elke persoon 2,4 of $2\frac{2}{5}$ blokke kry?

Die stelsel van heelgetalle maak nie voorsiening vir 'n antwoord op alle moontlike delingsvrae nie. Hier bo, byvoorbeeld, is die antwoord van $12 \div 5$ nie 'n telgetal of 'n heelgetal nie. Om antwoorde vir alle moontlike delingsvrae te hê moet ons die getallestelsel uitbrei om breuke en negatiewe breuke in te sluit, met ander woorde getalle van die vorm $\frac{\text{heelgetal}}{\text{heelgetal}}$. Hierdie getallestelsel word die **rasionale getalle** genoem. Ons kan rasionale getalle as gewone breuke of as desimale voorstel.

8. Druk die antwoorde vir elk van die volgende delingsprobleme op twee maniere uit: in gewone breuknotasie en in die desimale notasie vir breuke.

- (a) $23 \div 10$ (b) $23 \div 5$
-
- (c) $230 \div 100$ (d) $8 \div 10$
-

9. Dink na oor die bewerings en skryf “ja” of “nee” in elke sel van die tabel hier onder.

Bewering	Natuurlike getalle	Telgetalle	Heelgetalle	Rasionale getalle
Die som van twee getalle is 'n getal van dieselfde soort (geslote vir optel).				
Die som van twee getalle is altyd groter as enigeen van die getalle.				
As een getal van 'n ander afgetrek word, is die antwoord 'n getal van dieselfde soort (geslote vir aftrek).				
As een getal van 'n ander afgetrek word, is die antwoord altyd kleiner as die eerste getal.				
Die produk van twee getalle is 'n getal van dieselfde soort (geslote vir optel).				
Die produk van twee getalle is altyd groter as enigeen van die getalle.				
Die kwosiënt van twee getalle is 'n getal van dieselfde soort (geslote vir deling).				
Die kwosiënt van twee getalle is altyd kleiner as die eerste van die twee getalle.				

Die irrasionale getalle

Rasionale getalle maak nie voorsiening vir alle situasies wat in wiskunde kan voorkom nie. Daar is byvoorbeeld nie 'n rationale getal wat die antwoord 2 sal gee as dit met homself vermenigvuldig word nie, dit wil sê:

$$(\text{getal}) \times (\text{dieselfde getal}) = 2$$

$2 \times 2 = 4$ en $1 \times 1 = 1$, so dis duidelik dat hierdie getal tussen 1 en 2 moet wees. Maar daar is nie 'n getal wat as 'n breuk uitgedruk kan word wat hierdie probleem sal oplos nie, nie in gewone breuknotasie nie en ook nie in die desimale notasie vir breuke nie. Getalle soos dié word **irrasionale getalle** genoem.

Hier is nog 'n paar voorbeelde van irrasionale getalle:

$$\sqrt{5} \quad \sqrt{10} \quad \sqrt{3} \quad \sqrt{7} \quad \pi$$

Die rationale en irrasionale getalle staan saam bekend as die **reële getalle**.

1.2 Berekeninge met telgetalle

Moet glad nie 'n sakrekenaar in afdeling 1.2 gebruik nie.

SKAT, ROND AF EN KOMPENSEER

- 'n Winkeleienaar wil hoenders by 'n boer koop. Die boer wil R38 vir elke hoender hê. Beantwoord die volgende vrae sonder om enige berekeninge neer te skryf.
 - As die winkeleienaar R10 000 het om hoenders te koop, dink jy hy kan meer as 500 hoenders koop?
 - Dink jy hy kan meer as 200 hoenders koop?
 - Dink jy hy kan meer as 250 hoenders koop?

Wat jy in vraag 1 probeer doen het, word **skatting** genoem. As jy met getalle werk, beteken skatting om so na as moontlik by die regte antwoord uit te kom sonder om werklik 'n berekening te maak. Jy kan egter ander, makliker berekeninge doen as jy skat.

Wanneer 'n akkurate antwoord nie nodig is nie, kan getalle afgerond word. So kan ons byvoorbeeld die koste van 51 hoenders teen R38 **benader** deur 50×40 te bereken. Dit is duidelik baie makliker as om $51 \times R38$ te bereken.

Om iets te benader beteken om te probeer uitvind min of meer hoeveel dit is, sonder om dit presies te meet of te bereken.

- Hoeveel is 5×4 ?
 - Hoeveel is 5×40 ?
 - Hoeveel is 50×40 ?

Die koste van 51 hoenders teen R38 elk is nagenoeg R2 000.

Hierdie benadering is verkry deur beide 51 en 38 tot die naaste veelvoud van 10 af te rond en dan met die veelvoude van 10 te bereken.

- Skat die koste deur af te rond om die benaderde koste te bereken (sonder om 'n sakrekenaar te gebruik). Maak elke keer twee skattings. Maak eers 'n ruwe skatting deur die getalle tot die naaste 100 af te rond voor berekening. Maak dan 'n beter skatting deur die getalle tot die naaste 10 af te rond voor berekening.

- 83 bokke word vir R243 elk verkoop. (b) 121 stoele word vir R258 elk verkoop.

.....

.....

- R5 673 word by R3 277 getel. (d) R874 word van R1 234 afgetrek.

.....

.....

Gestel jy moet $R823 - R273$ bereken.

Jy kan 'n skatting maak deur die getalle tot die naaste 100 af te rond:

$$R800 - R300 = R500$$

4. (a) Deur met R800 in plaas van R823 te werk, is 'n fout in jou antwoord ingebring. Hoe kan hierdie fout reggestel word: deur R23 by die R500 te tel, of deur dit van R500 af te trek?
- (b) Stel die fout reg om 'n beter skatting te kry.
- (c) Stel nou ook die fout reg wat gemaak is deur R300 in plaas van R273 af te trek.

Wat jy in vraag 4 gedoen het word **kompensering vir foute** genoem.

5. Skat elk van die volgende deur die getalle tot die naaste 100 af te rond.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) $812 - 342$
..... | (b) $2\,342 - 1\,876$
..... |
| (c) $812 + 342$
..... | (d) $2\,342 + 1\,876$
..... |
| (e) $9 + 278$
..... | (f) $3\,231 - 1\,769$
..... |
| (g) $8\,234 - 2\,776$
..... | (h) $5\,213 - 3\,768$
..... |

6. Bepaal die presiese antwoord vir elk van die berekeninge in vraag 5 deur die foute uit te werk wat deur afronding veroorsaak is en daarvoor te kompenseer.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a)
.....
.....
..... | (b)
.....
.....
..... |
| (c)
.....
.....
..... | (d)
.....
.....
..... |

(e)

.....
.....
.....

(f)

.....
.....
.....

(g)

.....
.....
.....

(h)

.....
.....
.....

TEL OP IN KOLOMME

1. (a) Skryf $8\ 000 + 1\ 100 + 130 + 14$ as een getal:
- (b) Skryf $3\ 000 + 700 + 50 + 8$ as een getal:
- (c) Skryf 5 486 in uitgebreide notasie, soos in 1(b) gewys word.
.....

Jy kan $3\ 758 + 5\ 486$ bereken soos hier links onder gewys word.

	3 758	
	5 486	
Stap 1	8 000	
Stap 2	1 100	
Stap 3	130	
Stap 4	14	
	9 244	

Jy kan dit kortweg doen, soos aan die regterkant gewys word. Jy moet wel jou brein 'n bietjie meer inspan, maar dit spaar papier!

3 758
5 486
9 244

2. Verduidelik hoe die getalle in elkeen van stappe 1 tot 4 verkry word.

.....
.....
.....
.....

Dit is net moontlik om die korter metode te gebruik as jy die ene eerste optel, dan die tiene, dan die honderde en laastens die duisende. Dan kan jy doen wat jy in vraag 1(a) gedoen het, sonder om die getalle apart in uitgebreide vorm neer te skryf.

3. Bereken elk van die volgende sonder om 'n sakrekenaar te gebruik.

(a) $3\ 878 + 3\ 784$

(b) $298 + 8\ 594$

.....

.....

.....

(c) $10\ 921 + 2\ 472$

(d) $1\ 298 + 18\ 782$

.....

.....

.....

4. 'n Boer koop 'n trok vir R645 840, 'n trekker vir R783 356, 'n ploeg vir R83 999 en 'n bakkie vir R435 690.

(a) Skat tot die naaste R100 000 hoeveel hierdie items altesaam sal kos.

.....

.....

(b) Gebruik 'n sakrekenaar om die totale koste te bereken.

.....

.....

5. 'n Belegger maak eers R543 682 op die aandelemark en verloor dan weer R264 359 op dieselfde dag.

(a) Skat tot die naaste R100 000 hoeveel geld sy daardie dag gemaak het.

.....

.....

(b) Gebruik 'n sakrekenaar om die werklike bedrag te bepaal.

.....

VERMENIGVULDIG IN KOLOMME

1. (a) Skryf 3 489 in uitgebreide notasie:
- (b) Skryf 'n uitdrukking sonder hakies neer wat ekwivalent is aan $7 \times (3\,000 + 400 + 80 + 9)$:

$7 \times 3\,489$ kan bereken word soos hier links onder gewys word.

	3 489	<i>Hier regs is 'n korter metode.</i>	3 489
	<u> </u> × 7		<u> </u> × 7
Stap 1	63		24 423
Stap 2	560		
Stap 3	2 800		
Stap 4	<u>21 000</u>		
	24 423		

2. Verduidelik hoe die getalle in elke stap van 1 tot 4 links bo verkry is.

.....

$47 \times 3\,489$ kan bereken word soos hier links onder gewys word.

	3 489	<i>Hier regs is 'n korter metode.</i>	3 489
	<u> </u> × 47		<u> </u> × 47
Stap 1	63		24 423
Stap 2	560		139 560
Stap 3	2 800		<u>163 983</u>
Stap 4	21 000		
Stap 5	360		
Stap 6	3 200		
Stap 7	16 000		
Stap 8	<u>120 000</u>		
	163 983		

3. Verduidelik hoe die getalle in elke stap van 5 tot 8 hier links bo verkry is.

.....

4. Verduidelik hoe die getal 139 560 wat in die korter vorm regs bo verskyn, verkry is.

.....

TREK AF IN KOLOMME

- Skryf elk van die volgende as een getal.
 - $8\ 000 + 400 + 30 + 2$
 - $7\ 000 + 1\ 300 + 120 + 12$
 - $3\ 000 + 900 + 50 + 7$

2. As jy reg gewerk het, sal jou antwoorde vir vrae 1(a) en 1(b) dieselfde wees. As dit nie die geval is nie, doen jou werk oor.

Die uitdrukking $7\ 000 + 1\ 300 + 120 + 12$ in vraag 1(b) is gevorm uit $8\ 000 + 400 + 30 + 2$ deur

- 1 000 by $8\ 000$ weg te vat en dit by die honderde-term te tel om 1 400 te kry,
- 100 by 1 400 weg te vat en dit by die tiene-term te tel om 130 te kry, en
- 10 by 130 weg te vat en dit by die ene-term te tel om 12 te kry.

- Vorm 'n uitdrukking soos die uitdrukking in vraag 1(b) vir elk van die volgende:
 - $8\ 000 + 200 + 100 + 4$
 - $3\ 000 + 400 + 30 + 1$

- Skryf uitdrukkings soos dié in vraag 1(b) vir die getalle hier onder.
 - 7 214
 - 8 103

$8\ 432 - 3\ 957$ kan soos volg bereken word:

	8 432
	- 3 957
Stap 1	5
Stap 2	70
Stap 3	400
Stap 4	4 000
Stap 5	4 475

Om die aftrekking in elke kolom te doen moet jy aan $8\ 432$ dink as $8\ 000 + 400 + 30 + 2$. Jy moet eintlik daaraan dink as $7\ 000 + 1\ 300 + 120 + 12$. In stap 1 word die 7 in $3\ 957$ van 12 afgetrek.

- Hoe word die 70 in stap 2 verkry?
 - Hoe word die 400 in stap 3 verkry?
 - Hoe word die 4 000 in stap 4 verkry?
 - Hoe word die 4 475 in stap 5 verkry?

Weens die nulle wat in stap 2, 3 en 4 verkry word, hoef die antwoorde eintlik nie apart neergeskryf te word soos op die vorige bladsy gewys is nie. Die werk kan eintlik op die kort manier, soos hier regs, gedoen word.

$$\begin{array}{r} 8\ 432 \\ - 3\ 957 \\ \hline 4\ 475 \end{array}$$

6. Bereken elk van die volgende sonder om 'n sakrekenaar te gebruik.

(a) $9\ 123 - 3\ 784$

(b) $8\ 284 - 3\ 547$

.....

7. Gebruik 'n sakrekenaar om jou antwoorde vir vraag 6 te kontroleer. As jou antwoorde verkeerd is, probeer weer!

8. Bereken elk van die volgende sonder om 'n sakrekenaar te gebruik.

(a) $7\ 243 - 3\ 182$

(b) $6\ 221 - 1\ 888$

.....

Jy mag 'n sakrekenaar gebruik om die berekening hier onder te doen.

9. Bettina het R87 456 in haar spaarrekening. Sy onttrek R44 800 om 'n motor te koop. Hoeveel geld is in haar spaarrekening oor?

.....

10. Liesbet open 'n spaarrekening deur 'n deposito van R40 000 te maak. Sy doen oor 'n tydperk die volgende transaksies op die spaarrekening:

'n onttrekking van R4 000

'n onttrekking van R2 780

'n deposito van R1 200

'n deposito van R7 550

'n onttrekking van R5 230

'n deposito van R8 990

'n deposito van R1 234

Hoeveel geld het sy nou in haar spaarrekening?

Hier beteken "deposito" 'n inbetaling.

11. (a) $R34\ 537 - R13\ 267$

(b) $R135\ 349 - R78\ 239$

.....

LANGDELING

Kyk na hierdie metode om $13\,254 \div 56$ te bereken:

	13 254		
200 × 56 = 11 200	<u>11 200</u>		(200 is 'n skatting van die antwoord vir $13\,254 \div 56$)
	2 054		(2 054 bly oor nadat 11 200 van 13 254 afgetrek is)
30 × 56 = 1 680	<u>1 680</u>		(30 is 'n skatting van die antwoord vir $2\,054 \div 56$)
	374		(374 bly oor nadat 1 680 van 2 054 afgetrek is)
6 × 56 = 336	<u>336</u>		(6 is 'n skatting van die antwoord vir $374 \div 56$)
236 × 56 = 13 216	38		(38 bly oor)

So $13\,254 \div 56 = 236$ res 38, of $13\,254 \div 56 = 236\frac{38}{56} = 236\frac{19}{28}$, wat ook as 236,68 (korrek tot twee desimale syfers) geskryf kan word.

Die werk kan ook soos volg uiteengesit word:

	6		
	30		
	<u>200</u>		
56	13 254	of ietwat korter as	13 254
	<u>11 200</u>		<u>11 200</u>
	2 054		2 054
	<u>1 680</u>		<u>1 680</u>
	374		374
	<u>336</u>		<u>336</u>
	38		38

1. (a) Mlungisi se werk om 'n sekere berekening te doen word hier regs gewys. Wat is die vraag wat Mlungisi probeer beantwoord?

				463	
	36 177				
	<u>31 200</u>				
	4 977				
	<u>4 680</u>				
	297				
	<u>234</u>				
	63				

.....

- (b) Waar kom die getal 31 200 in stap 1 vandaan? Hoe het Mlungisi dit gekry en vir watter doel het hy dit bereken?

.....

- (c) Verduidelik stap 2 op dieselfde manier as wat jy stap 1 verduidelik het.

.....

- (d) Verduidelik stap 3.

.....

2. Bereken elk van die volgende sonder om 'n sakrekenaar te gebruik.

(a) $33\,030 \div 63$

(b) $18\,450 \div 27$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Gebruik 'n sakrekenaar om jou antwoorde vir vraag 2 te kontroleer. As jou antwoorde verkeerd is, probeer weer. Dis belangrik dat jy langdeling reg kan doen.

4. Bereken elk van die volgende sonder om 'n sakrekenaar te gebruik.

(a) $76\,287 \div 287$

(b) $65\,309 \div 44$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Gebruik jou sakrekenaar vir vrae 5 en 6.

5. 'n Munisipaliteit het R85 000 begroot om nuwe straatnaamborde op te sit. Die straatnaamborde kos R72 elk. Hoeveel nuwe straatnaamborde kan opgesit word en hoeveel geld sal in die begroting oor wees?

.....

.....

6. 'n Meubelhandelaar het R840 000 gekwoteer om 3 450 skoolbanke te verskaf. 'n Skoolverskaffingsmaatskappy het R76 000 gekwoteer om 2 250 van dieselfde tipe skoolbank te verskaf. Watter verskaffer is die goedkoopste en wat vra elk van die verskaffers vir een skoolbank?

.....

.....

1.3 Veelvoude en faktore

KLEINSTE GEMENE VEELVOUD EN PRIEMFAKTORISERING

1. Die tabel wys opeenvolgende veelvoude van 6, beginnende met 6.

6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
126	132	138	144	150	156	162	168	174	180
186	192	198	204	210	216	222	228	234	240

- (a) Hierdie tabel wys ook veelvoude van 'n getal. Wat is die getal?

15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
315	330	345	360	375	390	405	420	435	450
465	480	495	510	525	540	555	570	585	600

- (b) Omkring al die getalle wat in albei tabelle voorkom.
 (c) Wat is die kleinste getal wat in albei tabelle voorkom?

90 is 'n veelvoud van 6. Dit is ook 'n veelvoud van 15.

90 word 'n **gemene veelvoud** van 6 en 15 genoem, dit is 'n veelvoud van albei.

Die kleinste getal wat 'n veelvoud van beide 6 en 15 is, is die getal 30. Die getal 30 word die **kleinste gemene veelvoud** of **KGV** van 6 en 15 genoem.

2. Bereken, sonder om 'n sakrekenaar te gebruik.

(a) $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$

(b) $2 \times 2 \times 5 \times 7 \times 13$

.....

(c) $2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 13$

(d) $3 \times 5 \times 5 \times 17$

.....

Gebruik 'n sakrekenaar om jou antwoorde te kontroleer of vergelyk dit met dié van 'n paar klasmaats.

2 is 'n faktor van elk van die getalle 2 310, 1 820 en 3 510.

'n Ander manier om dit te sê is: 2 is 'n **gemene deler** van 2 310, 1 820 en 3 510.

3. (a) Is 2×3 , dit wil sê 6, 'n gemene deler van 2 310 en 3 510?
- (b) Is $2 \times 3 \times 5$, dit wil sê 30, 'n gemene deler van 2 310 en 3 510?
- (c) Is daar enige groter getal as 30 wat 'n gemene deler van 2 310 en 3 510 is?

30 word die **grootste gemene deler** of **GGD** van 2 310 en 3 510 genoem.

Die **priemfaktore** van die getalle 2 310, 1 820, 3 510 en 1 275 is in vraag 2 gelys.

Die KGV van twee getalle kan bepaal word deur al die priemfaktore van albei getalle met mekaar te vermenigvuldig, sonder herhaling (behalwe waar 'n getal as 'n faktor in een van die getalle herhaal word).
 Die GGD van twee getalle kan bepaal word deur die priemfaktore wat gemeenskaplik aan beide getalle is met mekaar te vermenigvuldig, dit wil sê dié wat in albei getalle se lys priemfaktore voorkom.

4. Bepaal telkens die GGD en KGV van die twee getalle.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (a) 1 820 en 3 510 | (b) 2 310 en 1 275 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| (c) 1 820 en 3 510 en 1 275 | (d) 2 310 en 1 275 en 1 820 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| (e) 780 en 7 700 | (f) 360 en 1 360 |
| | |
| | |
| | |
| | |

1.4 Probleemoplossing: verhouding, koers (tempo) en eweredigheid

Jy mag 'n sakrekenaar gebruik in hierdie afdeling.

PROBLEME OOR VERHOUDING, KOERS (TEMPO) EN EWEREDIGHEID

1. Moeneba pluk appels in die vrugteboord. Sy pluk elke minuut omtrent 5 appels. Ongeveer hoeveel appels sal Moeneba in elk van die volgende tye pluk?

- (a) 8 minute (b) 11 minute
 (c) 15 minute (d) 20 minute

In die situasie wat in vraag 1 beskryf word, pluk Moeneba appels **teen 'n tempo van omtrent 5 appels per minuut**. 'n Ander manier om dit te beskryf, is om te sê **die koers** waarteen Moeneba appels pluk, **is 5 appels per minuut**.

2. Garth en Kate pluk ook appels in die boord, maar hulle werk albei vinniger as Moeneba. Garth pluk teen 'n tempo van omtrent 12 appels per minuut en Kate pluk teen 'n tempo van omtrent 15 appels per minuut. Voltooi die tabel om te wys ongeveer hoeveel appels hulle elkeen in verskillende tydintervalle sal pluk.

Tydperk in minute	1	2	3	8	10	20
Moeneba	5			40		
Garth	12					
Kate	15					
Al drie saam	32					

In hierdie situasie is die getal appels wat gepluk word **direk eweredig** aan die tyd wat dit neem om die appels te pluk.

As jy die tabel reg ingevul het, sal jy sien dat Kate tydens enige tydinterval 3 keer soveel appels soos Moeneba gepluk het. Ons kan sê dat die **verhouding** tussen die getal appels wat Moeneba gepluk het en die getal appels wat Kate gepluk het, tydens enige tydinterval **3 tot 1** is. Ons kan dit skryf as **3:1**. Die verhouding tussen die getal appels wat Garth gepluk het en dié wat Moeneba gepluk het, is tydens enige tydinterval 12:5.

3. (a) Wat is die verhouding tussen die getal appels wat Kate en Garth tydens enige tydinterval gepluk het?
- (b) Sal dit ook korrek wees om te sê dat die verhouding tussen die getal appels wat Kate en Garth gepluk het 5:4 is? Verduidelik jou antwoord.

.....

4. Om 'n sekere soort beskuitjie te maak, moet 5 dele koekmeel met 2 dele hawermeel en 1 deel kakaopoeier gemeng word. Hoeveel hawermeel en hoeveel kakaopoeier moet gebruik word as 500 g koekmeel gebruik word?

.....

5. 'n Motoris ry 'n afstand van 360 km in presies 4 ure.

(a) Ongeveer hoe ver het die motoris in 1 uur gery?

(b) Dink jy die motoris het presies 90 km in elk van die 4 ure gery? Verduidelik jou antwoord kortliks.

.....

(c) Ongeveer hoe ver sal die motoris in 7 ure ry?

(d) Ongeveer hoeveel tyd sal hy/sy nodig hê om 900 km te ry?

Party mense gebruik hierdie formules om berekeninge soos dié in vraag 5 te doen:

- **gemiddelde spoed** = $\frac{\text{afstand}}{\text{tyd}}$, wat hier afstand ÷ tyd beteken
- **afstand** = **gemiddelde spoed** × **tyd**
- **tyd** = $\frac{\text{afstand}}{\text{gemiddelde spoed}}$, wat hier afstand ÷ gemiddelde spoed beteken

6. Watter van die formule(s) sal die korrekte antwoorde lewer op vrae 5(c) en (d)?

.....

7. 'n Motoris lê 'n reis af in drie dele. Tussen die dele hou hy lank stil om te eet en te rus. Tydens deel A van die reis ry hy 440 km in 4 ure. Tydens deel B ry hy 540 km in 6 ure. Tydens deel C ry hy 280 km in 4 ure.

(a) Bereken sy gemiddelde spoed oor elk van die drie dele.

.....

.....

.....

(b) Bereken sy gemiddelde spoed vir die reis as geheel.

.....

.....

.....

(c) Die motoris moet die volgende dag 874 km ry. Hoeveel tyd (ruspouses uitgesluit) sal hy nodig hê om dit te doen? Staaf jou antwoord met berekeninge.

.....

.....

8. Die gemiddelde spoed waarteen voertuie ry, verskil. 'n Groot vervoertrok met 'n swaar vrag ry baie stadiger as 'n passasiersmotor. 'n Klein bakkie is ook stadiger as 'n passasiersmotor. In die tabel word die gemiddelde spoed en die tye wat benodig word deur verskillende voertuie wat almal dieselfde afstand van 720 km moet ry, gewys. Voltooi die tabel.

Tyd in ure	12	9	8	6	5
Gemiddelde spoed in km/h	60				

9. Kyk na die tabel wat jy nou net voltooi het.
- (a) Wat gebeur met die tyd wat benodig word as die gemiddelde spoed toeneem?

- (b) Wat gebeur met die gemiddelde spoed as die tyd verminder word?

- (c) Wat kan jy oor die produk, gemiddelde spoed \times tyd, van die getalle in die tabel sê?

In die situasie hier bo sê ons die gemiddelde spoed is **omgekeerd eweredig** aan die tyd wat vir die reis benodig word.

1.5 Probleemoplossing in finansiële kontekste

Jy mag 'n sakrekenaar gebruik in afdeling 1.5.

AFSLAG, WINS EN VERLIES

1. R12 800 word gelykop tussen 100 mense verdeel.
- (a) Hoeveel geld kry elke persoon?
- (b) Hoeveel geld kry agt van die mense saam?

'n Ander woord vir honderdstes is **persent**.

In plaas van $\frac{5}{100}$ kan ons 5% skryf. Die simbool % beteken presies dieselfde as $\frac{\quad}{100}$.

In vraag 1(a) het jy $\frac{1}{100}$ of 1% van R12 800 bereken, en in vraag 1(b) het jy $\frac{8}{100}$ of 8% van R12 800 bereken.

Die bedrag wat 'n handelaar vir 'n artikel betaal, word die **kosprys** genoem. Die prys wat op die artikel gemerk is, word die **gemerkte prys** of **merkprys** genoem.

Die prys van die artikel na afslag is die **verkoopprys**.

2. Hier onder is die gemerkte pryse van 'n paar artikels. 'n Afslag van 15% word aan klante gebied wat kontant betaal. Bereken hoeveel 'n klant wat kontant betaal vir elk van die artikels sal betaal.

(a) R850

(b) R140

.....

(c) R32 600

(d) R138

.....

Lina het 'n rusbank op 'n uitverkoop gekoop. Dit was vir R3 500 gemerk maar sy het net R2 800 betaal. Sy het 'n afslag van R700 gekry.

Watter persentasie afslag het Lina gekry?

Hierdie vraag beteken:

Hoeveel honderdstes van die gemerkte prys is afgetrek?

Om die vraag te beantwoord moet ons weet hoeveel $\frac{1}{100}$ (een honderdste) van die gemerkte prys is.

3. (a) Hoeveel is $\frac{1}{100}$ van R3 500?

(b) Hoeveel honderdstes van R3 500 is dieselfde as R700?

.....

(c) Watter persentasie afslag het Lina gekry: 10% of 20%?

.....

4. Die kosprys, gemerkte prys en verkoopprijs van drie artikels is soos volg:

Artikel A: kosprys = R240; gemerkte prys = R360; verkoopprijs = R324

Artikel B: kosprys = R540; gemerkte prys = R700; verkoopprijs = R560

Artikel C: kosprys = R1 200; gemerkte prys = R2 000; verkoopprijs = R1 700

Die wins is die verskil tussen die kosprys en die verkoopprijs.

Bereken vir elk van die artikels hier bo die persentasie afslag en die persentasie wins.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Remy het besluit om van die huis af te werk en het 'n naaimasjien vir R750 gekoop. Sy het beplan om 40 kussingoortreksels te maak en dit teen R150 elk te verkoop. Die materiaal en ander benodigdhede het altesaam R3 600 gekos.

(a) Hoeveel wins kan Remy maak as sy al 40 oortreksels teen hierdie prys verkoop?

.....

(b) Remy kon net 25 van die oortreksels verkoop en sy het besluit om die res teen R100 elk te verkoop. Bereken haar persentasie wins.

.....

6. Zadie bak en verkoop pasteie om 'n ekstra inkomste te verdien. Die bestanddele vir haar hoenderpasteie het ongeveer R68 gekos. Sy het die pasteie vir R60 verkoop. Het Zadie 'n wins gemaak of 'n verlies gely? Bereken die persentasie verlies of wins.

.....

HUURKOOP

Soms het jy 'n item nodig maar jy het nie genoeg geld om die volle bedrag dadelik te betaal nie. Een opsie is om die item op **huurkoop (HK)** te koop. Jy sal 'n deposito moet betaal en 'n ooreenkoms moet onderteken waarin jy onderneem om maandelikse paaieimente te betaal totdat jy die volle bedrag betaal het. Dus is

$$\text{HK-prys} = \text{deposito} + \text{totaal van die paaieimente}$$

Die verskil tussen die HK-prys en die kontantprys is die rente wat die handelaar jou vra omdat jy die item oor 'n tydperk afbetaal.

1. Sara koop 'n platskerm-televisie op huurkoop. Die kontantprys is R4 199. Sy moet 'n deposito van R950 en 12 maandelikse paaieimente van R360 betaal.

(a) Bereken die totale HK-prys.

.....

(b) Hoeveel rente betaal sy?

.....

2. Susie koop 'n motor op huurkoop. Die kontantprys van die motor is R130 000. Sy betaal 'n deposito van 10% op die kontantprys en sal vir 'n tydperk van drie jaar maandelikse paaieimente van R4 600 moet betaal. David koop dieselfde motor, maar kies 'n ander opsie. Hy betaal 'n deposito van 35% op die kontantprys en sal vir 'n tydperk van twee jaar maandelikse paaieimente van R3 950 moet betaal.

(a) Bereken die HK-prys vir albei opsies.

.....

(b) Bereken die verskil tussen die totale prys wat deur Susie en deur David betaal is.

.....

(c) Bereken die rente wat Susie en David moet betaal as 'n persentasie van die kontantprys.

.....

ENKELVOUDIGE RENTE

Wanneer rente vir 'n aantal jare op 'n bedrag (d.w.s. 'n vaste deposito) bereken word, sonder dat die rente elke jaar vir die doel van latere renteberekening by die bedrag getel word, verwys ons daarna as **enkelvoudige rente**. As die bedrag vir 'n gedeelte van 'n jaar belê word, moet die tydperk as 'n breukdeel van 'n jaar uitgedruk word.

1. Rentekoerse word gewoonlik as persentasies uitgedruk. Dit maak dit makliker om koerse te vergelyk. Druk elk van die volgende as 'n persentasie uit:

(a) 'n Koers van R5 vir elke R100

.....

(b) 'n Koers van R7,50 vir elke R50

.....

(c) 'n Koers van R20 vir elke R200

.....

(d) 'n Koers van x rand vir elke a rand

.....

2. Annie deponer R8 345 in 'n spaarrekening by Bonus Bank. Die rentekoers is 9% per jaar.

(a) Hoeveel rente sal sy aan die einde van die eerste jaar verdien het?

.....

(b) Annie besluit om die deposito van R8 345 vir 'n onbepaalde tydperk in die bankrekening te los en om aan die einde van elke jaar slegs die rente te onttrek. Hoeveel rente ontvang sy oor 'n tydperk van vyf jaar?

.....

3. Maxi het R3 500 teen 'n rentekoers van 5% per jaar belê. Haar totale rente was R875. Vir watter tydperk het sy die bedrag belê?

.....

4. Geld word vir 1 jaar teen 'n rentekoers van 8% per jaar belê. Voltooi die tabel van ekwivalente koerse.

Som belê (R)	1 000	2 500	8 000	20 000	90 000	x
Rente verdien (R)						

5. Rente op agterstallige rekeninge word teen 'n koers van 20% per jaar gehef. Bereken die rente verskuldig op 'n rekening wat 10 dae agterstallig is as die verskuldigde bedrag R260 is. (Gee jou antwoord tot die naaste sent.)

.....

6. 'n Bedrag geld wat by die bank belê is teen 5% enkelvoudige rente per jaar, het na 5 jaar op R6 250 te staan gekom. Hierdie eindbedrag sluit die rente in. Thuli het uitgewerk dat die eindbedrag $(1 + 0,05) \times \text{bedrag belê} \times 5$ is.

(a) Verduidelik hoe Thuli gedink het.

.....

.....

.....

.....

(b) Bereken die bedrag wat belê is.

.....

.....

SAAMGESTELDE RENTE

Wanneer die rente wat jaarliks verdien word by die oorspronklike bedrag getel word en die rente vir die volgende jaar op hierdie nuwe bedrag bereken word, staan die resultaat bekend as **saamgestelde rente**.

Voorbeeld:

R2 000 word teen 10% per jaar saamgestelde rente belê:

Einde van 1ste jaar: Bedrag = R2 000 + R200 rente = R2 200

Einde van 2de jaar: Bedrag = R2 200 + R220 rente = R2 420

Einde van 3de jaar: Bedrag = R2 420 + R242 rente = R2 662

1. 'n Bedrag van R20 000 word teen 5% per jaar saamgestelde rente belê.

(a) Wat is die totale waarde van die belegging na 1 jaar?

.....

(b) Wat is die totale waarde van die belegging na 2 jaar?

.....

(c) Wat is die totale waarde van die belegging na 3 jaar?

.....

2. Bonus Bank bied 'n beleggingskema vir 'n periode van twee jaar aan met 'n saamgestelde rentekoers van 15% per jaar. Meneer Pillay wil R800 daarin belê.

(a) Hoeveel geld sal aan die einde van die 2-jaar periode aan hom verskuldig wees?

.....

.....

(b) Hoeveel rente sal hy tydens die twee jaar verdien?

.....

3. Andrew en Zinzi stry oor rente wat hulle kan verdien op geld wat hulle vir Kersfees gekry het. Hulle het elkeen R750 gekry. Andrew wil sy geld vir 2 jaar teen 'n saamgestelde rentekoers van 14% per jaar in ABC Bougenootskap belê. Zinzi sê dat sy beter sal doen by Bonus Bank, waar sy 15% enkelvoudige rente per jaar oor 2 jaar sal verdien. Wie is reg?

.....

.....

.....

4. Meneer Martin belê R12 750 vir 3 jaar teen 5,3% saamgestelde rente wat kwartaalliks bereken word (d.w.s. vier keer per jaar).

(a) Hoeveel omsettingsperiodes sal sy belegging altesaam hê?

.....

(b) Hoeveel is sy belegging na 3 jaar werd?

.....

.....

(c) Bereken die totale rente wat hy op sy aanvanklike belegging verdien.

.....

5. Bereken die rente wat deur 'n belegging (P) van R5 000 teen 10% (r) saamgestelde rente oor 'n tydperk (n) van 3 jaar gegenerereer word. A is die eindbedrag. Gebruik die formule $A = P(1 + \frac{r}{100})^n$ om die rente te bereken.

.....

.....

WISSELKOERS EN KOMMISSIE

1. (a) Tim het £650 by Gatwick Lughawe in Engeland se buitelandse valutatoonbank gekoop teen 'n wisselkoers van R15,66 vir £1. Die toonbank het 2,5% kommissie op die transaksie gehef. Hoeveel het Tim bestee om die ponde te koop?

.....

.....

(b) Wat was die waarde van R1 in Britse pond op daardie dag?

.....

2. Mandy wil deur die internet 'n boek bestel. Die prys van die boek is \$25,86. Wat is die boek se prys in rand? Gebruik 'n wisselkoers van R9,95 vir \$1.

.....

3. Bongani is 'n motorverkoopsman. Hy verdien 'n kommissie van 3% op die verkoop van 'n motor met 'n waarde van R220 000. Werk uit hoeveel kommissie hy verdien.

.....

HOOFSTUK 2

Heelgetalle

In hierdie hoofstuk sal jy met getalle kleiner as 0 werk. Hierdie getalle word negatiewe getalle genoem. Hulle het spesiale eienskappe wat hulle nuttig maak vir spesifieke doeleindes, byvoorbeeld om ons in staat te stel om 'n vergelyking soos $x + 20 = 10$ op te los.

2.1	Watter getalle is kleiner as 0?.....	29
2.2	Optel en aftrek met heelgetalle	30
2.3	Vermenigvuldiging en deling met heelgetalle.....	32
2.4	Magte, wortels en woordprobleme	37

$5 + -15 =$	$5 - -15 =$	$5 \times -15 =$
$4 + -14 =$	$4 - -14 =$	$4 \times -14 =$
$3 + -13 =$	$3 - -13 =$	$3 \times -13 =$
$2 + -12 =$	$2 - -12 =$	$2 \times -12 =$
$1 + -11 =$	$1 - -11 =$	$1 \times -11 =$
$0 + -10 =$	$0 - -10 =$	$0 \times -10 =$
$-1 + -9 =$	$-1 - -9 =$	$-1 \times -9 =$
$-2 + -8 =$	$-2 - -8 =$	$-2 \times -8 =$
$-3 + -7 =$	$-3 - -7 =$	$-3 \times -7 =$
$-4 + -6 =$	$-4 - -6 =$	$-4 \times -6 =$
$-5 + -5 =$	$-5 - -5 =$	$-5 \times -5 =$
$-6 + -4 =$	$-6 - -4 =$	$-6 \times -4 =$
$-7 + -3 =$	$-7 - -3 =$	$-7 \times -3 =$
$-8 + -2 =$	$-8 - -2 =$	$-8 \times -2 =$
$-9 + -1 =$	$-9 - -1 =$	$-9 \times -1 =$
$-10 + 0 =$	$-10 - 0 =$	$-10 \times 0 =$
$-11 + 1 =$	$-11 - 1 =$	$-11 \times 1 =$
$-12 + 2 =$	$-12 - 2 =$	$-12 \times 2 =$
$-13 + 3 =$	$-13 - 3 =$	$-13 \times 3 =$
$-14 + 4 =$	$-14 - 4 =$	$-14 \times 4 =$
$-15 + 5 =$	$-15 - 5 =$	$-15 \times 5 =$

2 Heelgetalle

2.1 Watter getalle is kleiner as 0?

WAAROM MENSE BESLUIT HET OM NEGATIEWE GETALLE TE HÊ

Getalle soos -7 en -500 , die optellingsinverses van telgetalle, word **negatiewe getalle** genoem. Breuke kan ook negatief wees, bv. $-\frac{3}{4}$ en $-3,46$.

Die telgetalle en die negatiewe getalle word saam die **heelgetalle** genoem.

Die natuurlike getalle ($1; 2; 3; 4; \dots$) word gebruik om te tel, en breuke (rasionale getalle) word gebruik om te meet. Waarom het ons ook negatiewe getalle?

Wanneer 'n groter getal van 'n kleiner getal afgetrek word, kan die antwoord 'n negatiewe getal wees: $5 - 12 = -7$, en hierdie getal word **negatief 7** genoem.

Een van die belangrikste redes vir die uitvinding van negatiewe getalle was om oplossings te verskaf vir vergelykings soos hierdie:

Vergelyking	Oplossing	Verlangde eienskap van negatiewe getalle
$17 + x = 10$	$x = -7$ want $17 + (-7) = 17 - 7 = 10$	1. Om 'n negatiewe getal by te tel, is dieselfde as om die ooreenstemmende positiewe getal af te trek.
$5 - x = 9$	$x = -4$ want $5 - (-4) = 5 + 4 = 9$	2. Om 'n negatiewe getal af te trek, is dieselfde as om die ooreenstemmende positiewe getal by te tel.
$20 + 3x = 5$	$x = -5$ want $3 \times (-5) = -15$ $20 + (-15) = 5$	3. Die produk van 'n positiewe getal en 'n negatiewe getal is 'n negatiewe getal.

EIENSKAPPE VAN HEELGETALLE

1. Bepaal die getal wat die vergelyking waar maak. Sê ook watter van die eienskappe van heelgetalle in die tabel hier bo op die vergelyking van toepassing is.

(a) $20 - x = 50$

(b) $50 + x = 20$

.....

(c) $20 - 3x = 50$

(d) $50 + 3x = 20$

.....

2.2 Optel en aftrek met heelgetalle

Optel en aftrek van negatiewe getalle

Voorbeelde: $(-5) + (-3)$ en $(-20) - (-7)$

Dit word op dieselfde manier gedoen as optel en aftrek van positiewe getalle.

$$(-5) + (-3) = -8 \text{ en } -20 - (-7) = -13$$

Dit is net soos $5 + 3 = 8$ en $20 - 7 = 13$, of $R5 + R3 = R8$ en $R20 - R7 = R13$.

$(-5) + (-3)$ kan ook geskryf word as $-5 + (-3)$ of as $-5 + -3$

Trek 'n groter getal van 'n kleiner getal af

Voorbeelde: $5 - 9$ en $29 - 51$

Kom ons beskou eers die volgende:

$$5 + (-5) = 0 \quad 10 + (-10) = 0 \quad \text{en} \quad 20 + (-20) = 0$$

Kyk nou na $5 - 9$: As ons 5 van 5 aftrek, kry ons 0, maar dan moet ons nog 4 aftrek.

$$\begin{aligned} 5 - 9 &= \underline{5 - 5} - 4 \\ &= 0 - 4 \\ &= -4 \end{aligned}$$

Ons weet dat $-9 = (-4) + (-5)$

Gestel die getalle is groter, byvoorbeeld $29 - 51$.

$$29 - 51 = 29 - 29 - 22$$

$-51 = (-29) + (-22)$

Hoeveel sal oor wees van die 51 wat nog afgetrek moet word, nadat jy 29 van 29 afgetrek het om 0 te kry? Hoe kan ons uitvind? Is dit $51 - 29$?

Tel 'n positiewe en 'n negatiewe getal bymekaar

Voorbeelde: $7 + (-5)$; $37 + (-45)$ en $(-13) + 45$

Die volgende bewering is waar indien die getal 5 is:

$$20 - (\text{'n bepaalde getal}) = 15$$

Ons het ook getalle nodig wat sinne soos die volgende waar sal maak:

$$20 + (\text{'n bepaalde getal}) = 15$$

Maar om van 20 tot by 15 te kom, moet jy 5 aftrek.

Die getal wat ons nodig het om die sin $20 + (\text{'n bepaalde getal}) = 15$ waar te maak, moet die volgende vreemde eienskap hê:

As jy hierdie getal **bytel**, moet dit **dieselfde effek** hê as om **5 af te trek**.

Wiskundiges het dus ooreengekom dat die getal wat *negatief 5* genoem word, die eienskap sal hê dat as jy dit by 'n ander getal tel, die effek dieselfde sal wees as wanneer jy die natuurlike getal 5 aftrek.

Dit beteken dat wiskundiges ooreengekom het dat $20 + (-5)$ gelyk is aan $20 - 5$.

Anders gestel, in plaas daarvan om *negatief* 5 by 'n getal by te tel, kan jy 5 aftrek.

Om 'n negatiewe getal by te tel, het dieselfde effek as om 'n ooreenstemmende natuurlike getal af te trek.

Voorbeeld: $20 + (-15) = 20 - 15 = 5$.

Trek 'n negatiewe getal af

Ons het op die vorige bladsy te doen gehad met gevalle soos $-20 - (-7)$.

Die bewering

$$25 + (\text{'n bepaalde getal}) = 30$$

is waar indien die getal 5 is.

Ons het ook 'n getal nodig om hierdie bewering waar te maak:

$$25 - (\text{'n bepaalde getal}) = 30$$

As jy hierdie getal aftrek, moet dit dieselfde effek hê as om 5 by te tel.

Daar is ooreengekom dat $25 - (-5)$ gelyk is aan $25 + 5$.

In plaas daarvan om die negatiewe getal af te trek, word die ooreenstemmende positiewe getal (die optellingsinverses) bygetel.

$$8 - (-3) = 8 + 3$$

$$= 11$$

$$-5 - (-12) = -5 + 12$$

$$= 7$$

Ons kan sê dat vir elke “positiewe” getal daar 'n **ooreenstemmende** of **teenoorgestelde** negatiewe getal is. 'n Positiewe en 'n negatiewe getal wat ooreenstem, byvoorbeeld 3 en (-3) , word **optellingsinverses** genoem.

Trek 'n positiewe getal van 'n negatiewe getal af

Voorbeeld: $-7 - 4$ beteken in werklikheid $(-7) - 4$.

In plaas daarvan om 'n positiewe getal af te trek, kan die ooreenstemmende negatiewe getal bygetel word.

$$-7 - 4 \text{ kan beskou word as } (-7) + (-4) = -11$$

BEREKENINGE MET HEELGETALLE

Bereken.

1. $-7 + 18$

.....
.....

2. $24 - 30 - 7$

.....
.....

3. $-15 + (-14) - 9$

.....
.....

4. $35 - (-20)$

.....
.....

5. $30 - 47$

.....
.....

6. $(-12) - (-17)$

.....
.....

2.3 Vermenigvuldiging en deling met heelgetalle

VERMENIGVULDIG MET HEELGETALLE

1. Bereken.

(a) $-7 + -7 + -7 + -7 + -7 + -7 + -7 + -7 + -7 + -7 + -7$

.....
.....

(b) $-10 + -10 + -10 + -10 + -10 + -10 + -10$

.....
.....

(c) $10 \times (-7)$

(d) $7 \times (-10)$

.....

2. Sê of jy met elke bewering saamstem (✓) of nie saamstem nie (✗).

(a) $10 \times (-7) = 70$

(b) $9 \times (-5) = (-9) \times 5$

(c) $(-7) \times 10 = 7 \times (-10)$

(d) $9 \times (-5) = -45$

(e) $(-7) \times 10 = 10 \times (-7)$

(f) $5 \times (-9) = 45$

Vermenigvuldiging van heelgetalle is kommutatief:

$(-20) \times 5 = 5 \times (-20)$

DIE VERSPREIDINGSEIENSKAP

1. Bereken elkeen van die volgende. Let daarop dat hakies om twee redes in hierdie uitdrukkings gebruik word: om aan te dui dat bepaalde bewerkings eerste gedoen moet word, en om die heelgetalle aan te toon.

(a) $20 + (-5)$ (b) $4 \times (20 + (-5))$ (c) $4 \times 20 + 4 \times (-5)$

.....

.....

(d) $(-5) + (-20)$ (e) $4 \times ((-5) + (-20))$ (f) $4 \times (-5) + 4 \times (-20)$

.....

.....

2. As jy reg gewerk het, moet jou antwoorde vir vraag 1 die volgende wees: 15; 60; 60; -25; -100 en -100. As jou antwoorde verskil, kyk waar dinge verkeerd geloop het en maak jou werk reg.

3. Kyk hoeveel van die volgende jy kan bereken:

(a) $20 + (-15)$ (b) $4 \times (20 + (-15))$ (c) $4 \times 20 + 4 \times (-15)$

.....

.....

(d) $(-15) + (-20)$ (e) $4 \times ((-15) + (-20))$ (f) $4 \times (-15) + 4 \times (-20)$

.....

(g) $10 + (-5)$ (h) $(-4) \times (10 + (-5))$ (i) $(-4) \times 10 + ((-4) \times (-5))$

.....

4. Watter eienskap van heelgetalle word in jou antwoorde vir vraag 3(a) en 3(g) gebruik? Verduidelik jou antwoord.

.....

.....

In vraag 3(i) moes jy twee negatiewe getalle vermenigvuldig. Wat was jou raaiskoot?

Ons kan $(-4) \times (10 + (-5))$ soos in (h) bereken. Dit is $(-4) \times 5 = -20$.

As ons wil hê die verspreidingseienskap moet waar wees vir heelgetalle, dan moet $(-4) \times 10 + (-4) \times (-5)$ gelyk wees aan -20 .

$$(-4) \times 10 + (-4) \times (-5) = -40 + (-4) \times (-5)$$

Dan moet $(-4) \times (-5)$ gelyk wees aan 20.

5. Bereken.

(a) $10 \times 50 + 10 \times (-30)$

(b) $50 + (-30)$

.....

(c) $10 \times (50 + (-30))$

(d) $(-50) + (-30)$

.....

(e) $10 \times (-50) + 10 \times (-30)$

(f) $10 \times ((-50) + (-30))$

.....

- Die produk van twee positiewe getalle is 'n positiewe getal, byvoorbeeld $5 \times 6 = 30$.
- Die produk van 'n positiewe getal en 'n negatiewe getal is 'n negatiewe getal, byvoorbeeld $5 \times (-6) = -30$.
- Die produk van 'n negatiewe getal en 'n positiewe getal is 'n negatiewe getal, byvoorbeeld $(-5) \times 6 = -30$.

6. (a) Onderstreep die numeriese uitdrukkings hier onder wat jy verwag dieselfde antwoorde sal hê. Moenie die berekeninge doen nie.

$16 \times (53 + 68)$ $53 \times (16 + 68)$ $16 \times 53 + 16 \times 68$ $16 \times 53 + 68$

(b) Watter eienskap van bewerkings word gewys deur die feit dat twee van die uitdrukkings hier bo dieselfde waarde het?

.....

7. Beskou jou antwoorde op vraag 5.

(a) Versprei vermenigvuldiging oor optel in die geval van heelgetalle?

(b) Illustreer jou antwoord met twee voorbeelde.

.....

.....

8. Onderstreep die numeriese uitdrukkings hier onder wat jy verwag dieselfde antwoorde sal hê. Moenie nou die berekeninge doen nie.

$10 \times ((-50) - (-30))$ $10 \times (-50) - (-30)$ $10 \times (-50) - 10 \times (-30)$

9. Doen die drie stelle berekeninge wat in vraag 8 gegee is.

.....

.....

10. Bereken $(-10) \times (5 + (-3))$.

.....
.....

11. Dink oor die vraag of vermenigvuldiging met 'n negatiewe getal oor optel en aftrek van heelgetalle versprei. Sal $(-10) \times 5 + (-10) \times (-3)$ byvoorbeeld ook die antwoord -20 hê, soos $(-10) \times (5 + (-3))$?

.....
.....

Om seker te maak dat vermenigvuldiging oor optel en aftrek in die stelsel van heelgetalle versprei, moet ons ooreenkom dat

('n negatiewe getal) \times ('n negatiewe getal) 'n positiewe getal is,

byvoorbeeld $(-10) \times (-3) = 30$.

12. Bereken elkeen van die volgende:

(a) $(-20) \times (-6)$

(b) $(-20) \times 7$

.....

(c) $(-30) \times (-10) + (-30) \times (-8)$

(d) $(-30) \times ((-10) + (-8))$

.....

(e) $(-30) \times (-10) - (-30) \times (-8)$

(f) $(-30) - ((-10) + (-8))$

.....

Hier is 'n opsomming van die eienskappe van heelgetalle wat dit moontlik maak om berekeninge met heelgetalle te doen:

- Wanneer 'n getal by sy optellingsinverses getal word, is die resultaat 0, byvoorbeeld $(+12) + (-12) = 0$.
- Om 'n heelgetal by te tel het dieselfde effek as om sy optellingsinverses af te trek, byvoorbeeld $3 + (-10)$ kan bereken word deur $3 - 10$ te bereken, en die antwoord is -7 .
- Om 'n heelgetal af te trek het dieselfde effek as om sy optellingsinverses by te tel, byvoorbeeld $3 - (-10)$ kan bereken word deur $3 + 10$ te bereken as 13.
- Die produk van 'n positiewe heelgetal en 'n negatiewe heelgetal is negatief, byvoorbeeld $(-15) \times 6 = -90$.
- Die produk van 'n negatiewe heelgetal en 'n negatiewe heelgetal is positief, byvoorbeeld $(-15) \times (-6) = 90$.

DEEL MET HEELGETALLE

1. Bereken.

(a) $5 \times (-7)$

(b) $(-3) \times 20$

.....

(c) $(-5) \times (-10)$

(d) $(-3) \times (-20)$

.....

2. Gebruik jou antwoorde in vraag 1 om die volgende te bepaal:

(a) $(-35) \div 5$

(b) $(-35) \div (-7)$

.....

(c) $(-60) \div 20$

(d) $(-60) \div (-3)$

.....

(e) $50 \div (-5)$

(f) $50 \div (-10)$

.....

(g) $60 \div (-20)$

(h) $60 \div (-3)$

.....

- Die kwosiënt van 'n positiewe getal en 'n negatiewe getal is 'n negatiewe getal.
- Die kwosiënt van twee negatiewe getalle is 'n positiewe getal.

GEMENGDE BEREKENINGE MET HEELGETALLE

1. Bereken.

(a) $20(-50 + 7)$

(b) $20 \times (-50) + 20 \times 7$

.....

(c) $20(-50 + -7)$

(d) $20 \times (-50) + 20 \times -7$

.....

(e) $-20(-50 + -7)$

(f) $-20 \times -50 + -20 \times -7$

.....

2. Bereken.

(a) $40 \times (-12 + 8) - 10 \times (2 + -8) - 3 \times (-3 - 8)$

.....

.....

(b) $(9 + 10 - 9) \times 40 + (25 - 30 - 5) \times 7$

.....

(c) $-50(40 - 25 + 20) + 30(-10 + 7 + 13) - 40(-16 + 15 - 2)$

.....

(d) $-4 \times (30 - 50) + 7 \times (40 - 70) - 10 \times (60 - 100)$

.....

(e) $-3 \times (-14 - 6 + 5) \times (-13 - 7 + 10) \times (20 - 10 - 15)$

.....

2.4 Magte, wortels en woordprobleme

Beantwoord al die vrae in hierdie afdeling sonder om 'n sakrekenaar te gebruik.

1. Voltooi die tabelle.

(a)

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x^2												
x^3												

(b)

x	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
x^2												
x^3												

3^2 is 9 en $(-3)^2$ is ook 9.

3^3 is 27 en $(-5)^3$ is -125.

Beide (-3) en 3 is **vierkantwortels** van 9.

3 kan die **positiewe vierkantwortel** van 9 genoem word en (-3) kan die **negatiewe vierkantwortel** van 9 genoem word.

3 word die **derdemagswortel** van 27 genoem, want $3^3 = 27$.

-5 word die derdemagswortel van -125 genoem, want $(-5)^3 = -125$.

10^2 is 100 en $(-10)^2$ is ook 100. Beide 10 en (-10) word **vierkantwortels** van 100 genoem.

Die simbool $\sqrt{\quad}$ beteken dat jy die **positiewe vierkantwortel** van die getal moet neem.

2. Bereken die volgende:

(a) $\sqrt{4} - \sqrt{9}$

(b) $\sqrt[3]{27} + (-\sqrt[3]{64})$

.....
.....

(c) $-(3^2)$

(d) $(-3)^2$

.....
.....

(e) $4^2 - 6^2 + 1^2$

(f) $3^3 - 4^3 - 2^3 - 1^3$

.....
.....

(g) $\sqrt{81} - \sqrt{4} \times \sqrt[3]{125}$

(h) $-(4^2)(-1)^2$

.....
.....

(i) $\frac{(-5)^2}{\sqrt{37-12}}$

(j) $\frac{-\sqrt{36}}{-1^3 - 2^3}$

.....
.....

3. Bepaal die antwoorde van die volgende:

(a) Die oornagtemperatuur in Polokwane daal van 11 °C tot -2 °C. Met hoeveel grade het die temperatuur gedaal?

.....

(b) Die temperatuur in Estcourt daal van 2 °C tot -1 °C in een uur, en dan nog twee grade in die volgende uur. Hoeveel grade het die temperatuur in totaal oor die twee uur gedaal?

.....

(c) 'n Duikboot is 75 m onder die see-oppervlak. Dit kom dan 21 m op. Hoe ver onder die oppervlak is dit nou?

.....

(d) 'n Duikboot is 37 m onder die see-oppervlak. Dit duik dan 'n verdere 15 m dieper. Hoe ver onder die oppervlak is dit nou?


.....

HOOFSTUK 3

Breuke

Hierdie hoofstuk is hoofsaaklik hersiening van die vorige grade se werk oor breuke. Dit word herhaal omdat dit noodsaaklik is dat jy met selfvertroue met breuke kan werk. Dit is dus belangrik dat jy al die antwoorde moet uitwerk *sonder om 'n sakrekenaar te gebruik*, en dat jy al die stappe moet wys.

3.1	Ekwivalente breuke	41
3.2	Optel en aftrek met breuke	45
3.3	Vermenigvuldiging en deling met breuke	48
3.4	Ekwivalente vorms.....	55



Watter deel van die blok is gekleur?

3 Breuke

3.1 Ekwivalente breuke

DIESELFDE GETAL IN VERSKILLENDEN VORMS

1. Hoeveel geld is elk van die volgende bedrae?

(a) $\frac{1}{5}$ van R200

(b) $\frac{2}{10}$ van R200

(c) $\frac{4}{20}$ van R200

.....

Het jy opgelet dat die antwoorde eenders is? Dit is omdat $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{10}$ en $\frac{4}{20}$ **ekwivalente breuke** is. Dit is verskillende maniere om dieselfde getal te skryf.

Kyk na hierdie staaf wat in vyf gelyke dele opgedeel is.



Elke deel is **een vyfde** van die hele staaf.

2. Trek lyne op die staaf hier onder om dit op te deel in 10 gelyke dele.



(a) Watter breuk van die hele staaf is elk van die 10 dele?

(b) Hoeveel tiendes is dieselfde as een vyfde?

(c) Hoeveel tiendes is dieselfde as twee vyfdes?

(d) Hoeveel vyfdes is dieselfde as agt tiendes?

3. Trek lyne op die staaf hier onder om dit op te deel in 25 gelyke dele.



(a) Hoeveel vyf-en-twintigstes is dieselfde as twee vyfdes?


(b) Hoeveel vyfdes is dieselfde as 20 vyf-en-twintigstes?

In vraag 3(b) het jy gevind dat $\frac{4}{5}$ ekwivalent is aan $\frac{20}{25}$: dit is bloot twee verskillende maniere om dieselfde breuk van die staaf te beskryf. Ons kan dit uitdruk deur $\frac{4}{5} = \frac{20}{25}$ te skryf, wat beteken dat $\frac{4}{5}$ en $\frac{20}{25}$ ekwivalent is.

4. Skryf al die ander pare ekwivalente breuke neer waarop jy afgekom het toe jy vrae 2 en 3 gedoen het.

.....

Die geel staaf is opgedeel in vyfdes.



5. (a) In watter breuke is die blou staaf opgedeel?
- (b) In watter breuke is die rooi staaf opgedeel?
- (c) Indien jy die geel staaf sou opdeel in twintigstes soos die blou staaf, in hoeveel dele sou jy elk van die vyfdes moes opdeel?
- (d) Indien jy die geel staaf sou opdeel in veertigstes soos die rooi staaf, in hoeveel dele sou jy elk van die vyfdes moes opdeel?
- (e) Indien jy die geel staaf sou opdeel in tagtigstes, in hoeveel dele sou jy elk van die vyfdes moes opdeel?
- (f) Indien jy die blou staaf sou opdeel in tagtigstes, in hoeveel dele sou jy elk van die twintigstes moes opdeel?

6. Gestel hierdie staaf word opgedeel in vier gelyke dele (m.a.w. kwarte).



- (a) Indien die staaf ook in 20 gelyke deeltjies opgedeel word, hoeveel van die kleiner dele sal gelyk wees aan elk van die kwarte?
- (b) Indien elke kwart eerder in 6 deeltjies opgedeel word, watter breuk van die hele staaf sal elke deeltjie wees?
7. Gebruik heelgetalle om hierdie tabel ekwivalente breuke so ver as moontlik te voltooi. Al die breuke in 'n kolom moet ekwivalent wees.

sestiendes	8	4	2	10	14	12
agstes						
kwarte						
twaalfdes						
twintigstes						

Ekwivalente breuke kan verkry word deur die teller en die noemer met dieselfde getal te vermenigvuldig, byvoorbeeld $\frac{1}{5} = \frac{4 \times 1}{4 \times 5} = \frac{4}{20}$.

8. Skryf vyf breuke neer wat ekwivalent is aan $\frac{3}{4}$.

.....

9. Skryf elk van die volgende getalle as twaalfdes:

(a) $\frac{2}{3}$

(b) $\frac{3}{4}$

.....

(c) $\frac{5}{6}$

(d) $\frac{1}{6}$

.....

Deur dieselfde getal in die teller en die noemer in te deel, in plaas daarvan om die teller en die noemer met dieselfde getal te vermenigvuldig, kan jy 'n eenvoudiger vorm van 'n breuk kry.

Wanneer 'n breuk in die **eenvoudigste vorm** is, het die teller en noemer geen gemene faktore (delers) nie. Jy kry byvoorbeeld die breuk $\frac{4}{12}$ se eenvoudigste vorm ($\frac{1}{3}$) deur beide die teller en noemer deur die gemene faktor, 4, te deel.

10. Skryf elk van die volgende breuke in hul eenvoudigste vorm:

(a) $\frac{40}{100}$

(b) $\frac{4}{16}$

.....

(c) $\frac{5}{25}$

(d) $\frac{6}{30}$

.....

(e) $\frac{6}{24}$

(f) $\frac{8}{88}$

.....

OMSKAKELING TUSSEN GEMENGDE GETALLE EN GEWONE BREUKE

Getalle wat bestaan uit 'n heelgetal en 'n gewone breuk word **gemengde getalle** genoem.

Voorbeelde van gemengde getalle: $3\frac{4}{5}$, $2\frac{7}{8}$ en $8\frac{3}{10}$

Gemengde getalle kan in uitgebreide vorm geskryf word, byvoorbeeld:

$$3\frac{4}{5} \text{ beteken } 3 + \frac{4}{5} \qquad 2\frac{7}{8} \text{ beteken } 2 + \frac{7}{8} \qquad 8\frac{3}{10} \text{ beteken } 8 + \frac{3}{10}$$

Wanneer gemengde getalle opgetel of afgetrek word is dit moontlik om met die heelgetal-deel en die breukdeel afsonderlik te werk:

$$\begin{array}{lll} 3\frac{4}{5} + 13\frac{3}{5} & 13\frac{3}{5} - 3\frac{4}{5} & \text{(dit is nodig om 'n een te "leen" by 13,} \\ = 16\frac{7}{5} & = 12\frac{8}{5} - 3\frac{4}{5} & \text{aangesien } \frac{4}{5} \text{ nie van } \frac{3}{5} \text{ afgetrek kan word nie)} \\ = 17\frac{2}{5} & = 9\frac{4}{5} & \end{array}$$

Hierdie metode werk egter nie vir vermenigvuldiging en deling nie, en is in sommige gevalle lastig selfs vir optel en aftrek.

'n Alternatiewe metode word dus gebruik vir vermenigvuldiging en deling, en ook dikwels verkies vir optel en aftrek, naamlik om die gemengde getalle om te skakel na **onegte breuke**, byvoorbeeld:

$$\begin{aligned} 3\frac{4}{5} &= 3 + \frac{4}{5} \\ &= \frac{15}{5} + \frac{4}{5} \\ &= \frac{19}{5} \end{aligned}$$

LET WEL:

Jy sou die teller 19 in een stap kon verkry deur die noemer (5) met die heelgetal (3) te maal en dan die teller (4) by te tel.

Jy kan dus $3\frac{4}{5} + 13\frac{3}{5}$ as volg bereken met hierdie metode:

$$\begin{aligned} 3\frac{4}{5} + 13\frac{3}{5} &= \frac{19}{5} + \frac{68}{5} \\ &= \frac{87}{5} \end{aligned}$$

Die antwoord moet weer omgeskakel word na 'n gemengde getal: $\frac{87}{5} = 17\frac{2}{5}$

1. Skryf die volgende gemengde getalle as onegte breuke:

(a) $5\frac{3}{5}$

(b) $2\frac{3}{8}$

.....

(c) $3\frac{4}{7}$

(d) $4\frac{5}{12}$

.....

2. Skryf die volgende onegte breuke as gemengde getalle:

(a) $\frac{32}{5}$

(b) $\frac{25}{8}$

.....

(c) $\frac{24}{9}$

(d) $\frac{37}{20}$

.....

3.2 Optel en aftrek met breuke

Om twee of meer breuke te kan optel of aftrek, moet hulle eers uitgedruk word met *dieselfde* noemers. Om dit reg te kry, moet een of meer van die gegewe breuke dalk vervang word met ekwivalente breuke.

$$\begin{aligned} \frac{3}{20} + \frac{2}{5} &= \frac{3}{20} + \frac{2 \times 4}{5 \times 4} \quad (\text{om twintigstes te kry}) \\ &= \frac{3}{20} + \frac{8}{20} \\ &= \frac{11}{20} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{5}{12} + \frac{7}{20} &= \frac{5 \times 20}{12 \times 20} + \frac{7 \times 12}{20 \times 12} \\ &= \frac{100}{240} + \frac{84}{240} \\ &= \frac{184}{240} \\ &= \frac{23}{30} \end{aligned}$$

Ons sal later na hierdie metode om breuke op te tel en af te trek verwys as Metode A.

In die geval van $\frac{5}{12} + \frac{7}{20}$, was die vermenigvuldiging van die noemers met 12 en 20 'n manier waarop jy vir seker ekwivalente breuke met dieselfde noemer sal kry, hier tweehonderd-en-veertigstes. Die getalle kan egter ongerieflik groot raak – dink net aan hoe groot die getalle sal wees as jy hierdie metode sou gebruik vir $\frac{17}{75} + \frac{13}{85}$!

Gelukkig is daar (in baie gevalle) 'n manier om die getalle kleiner te hou wanneer jy ekwivalente breuke maak om breuke op te tel of af te trek: jy kan die **kleinste gemene veelvoud** (KGV) van die noemers gebruik. In die geval van $\frac{5}{12} + \frac{7}{20}$ is die kleiner veelvoude van die noemers:

12:	12	24	36	48	60	72	84
20:	20	40	60	80	100	120	140

Die kleinste getal wat 'n veelvoud van beide 12 en 20 is, is 60.

Beide $\frac{5}{12}$ en $\frac{7}{20}$ kan uitgedruk word in sestigstes:

$$\frac{5}{12} = \frac{5 \times 5}{12 \times 5} = \frac{25}{60}, \text{ want twaalfdes word na sestigstes omgeskakel deur elke twaalfde in}$$

vyf gelyke dele op te deel. $12 \times 5 = 60$ gelyke dele word dus geskep.

$$\text{Net so is } \frac{7}{20} = \frac{7 \times 3}{20 \times 3} = \frac{21}{60}.$$

$$\text{Gevolgtik is } \frac{5}{12} + \frac{7}{20} = \frac{25}{60} + \frac{21}{60} = \frac{46}{60} = \frac{23}{30}$$

Hierdie metode kan die **KGV-metode** om breuke op te tel en af te trek genoem word.

OPTEL EN AFTREK VAN BREUKE

- Watter metode om breuke op te tel en af te trek dink jy sal meestal vir jou die vinnigste en maklikste wees, Metode A (op bladsy 45) of die KGV-metode? Verduidelik.

.....

.....

- Bereken:

(a) $\frac{3}{8} + \frac{2}{5}$

(b) $\frac{3}{10} + \frac{7}{8}$

.....

.....

(c) $3\frac{2}{5} + 2\frac{3}{10}$

(d) $7\frac{3}{8} + 3\frac{11}{12}$

.....

.....

3. Bereken elk van die volgende:

(a) $\frac{13}{20} - \frac{2}{5}$

(b) $\frac{7}{12} - \frac{1}{4}$

.....

(c) $5\frac{1}{2} - 3\frac{3}{8}$

(d) $4\frac{1}{9} - 5\frac{2}{3}$

.....

.....

4. Paulo en Sergio koop 'n pizza. Paulo eet $\frac{1}{3}$ van die pizza en Sergio eet twee vyfdes. Hoeveel van die pizza bly oor?

.....

.....

5. Bereken elk van die volgende. Sê of jy Metode A of die KGV-metode gebruik.

(a) $\frac{7}{15} + \frac{11}{24}$

(b) $\frac{73}{100} - \frac{7}{75}$

.....

.....

(c) $\frac{3}{25} + \frac{13}{40}$

(d) $\frac{9}{16} - \frac{3}{10}$

.....

.....

(e) $\frac{1}{18} + \frac{7}{20}$

(f) $\frac{11}{35} - \frac{3}{14}$

.....

.....

(g) $\frac{5}{8} + \frac{5}{8} + \frac{5}{8} + \frac{5}{8} + \frac{5}{8} + \frac{5}{8} + \frac{5}{8} + \frac{5}{8} + \frac{5}{8} + \frac{5}{8}$

.....

.....

3.3 Vermenigvuldiging en deling met breuke

DINK NA OOR BREUKE WAT VERMENIGVULDIG EN GEDEEL WORD

1. Lees die vrae hier onder, maar moenie nou antwoorde uitwerk nie. Sê net in elke geval watter berekening jy dink gedoen moet word om die antwoord te kry. Jy kan later dink oor *hoe* om die bewerkings te doen.

(a) 10 mense kom na 'n partytjie, en elkeen van hulle moet $\frac{5}{8}$ van 'n pizza kry. Hoeveel pizzas moet gekoop word om vir hul almal genoeg te wees?

.....

(b) $\frac{5}{8}$ van die koste van 'n nuwe kliniek moet gedra word deur die 10 dokters wat daar gaan werk. Hul het ooreengekom om die koste gelykop te verdeel. Watter deel van die koste moet deur elk van die dokters gedra word?

.....

(c) Indien 'n hele pizza R10 kos, hoeveel behoort $\frac{5}{8}$ van 'n pizza te kos?

.....

(d) Die eienaar van 'n spazawinkel het 10 hele pizzas. Hoeveel porsies van $\frac{5}{8}$ van 'n pizza kan hy opmaak uit die 10 pizzas?

.....

2. Kyk na die verskillende metodes van berekening boaan die volgende bladsy.

(a) Watter metode moet gebruik word by vraag 1(a)?

.....

(b) Watter metode moet gebruik word by vraag 1(b)?

.....

(c) Watter metode moet gebruik word by vraag 1(c)?

.....

(d) Watter metode moet gebruik word by vraag 1(d)?

.....

Metode A: $\frac{10}{10} \times \frac{5}{8} = \frac{50}{80}$

Metode B: $\frac{5}{8} = \frac{50}{80}$. 50 tagtigstes $\div 10 = \frac{5}{80}$

Metode C: Hoeveel agstes in tien heles? 80 agstes. Hoeveel vyf-agstes in 80? $80 \div 5 = 16$

Metode D: $\frac{5}{8}$ is 5 agstes. 10×5 agstes = $\frac{50}{8}$ **Metode E:** $\frac{5}{8} \div 10 = \frac{5}{8} \times \frac{10}{1} = \frac{50}{8}$

Vermenigvuldig 'n breuk met 'n heelgetal

Voorbeeld:

$$8 \times \frac{3}{5} = 8 \times 3 \text{ vyfdes} = 24 \text{ vyfdes} = \frac{24}{5} = 4\frac{4}{5}$$

Deel 'n breuk deur 'n heelgetal

Jy kan 'n breuk deur 'n heelgetal deel deur dit om te skakel na 'n ekwivalente breuk met 'n teller wat 'n veelvoud van die heelgetal is.

Voorbeeld:

$$\frac{2}{3} \div 5 = \frac{10}{15} \div 5 = 10 \text{ vyftiendes} \div 5 = 2 \text{ vyftiendes} = \frac{2}{15}$$

'n Breuk van 'n heelgetal, en 'n breuk van 'n breuk

Voorbeelde:

A. $\frac{7}{12}$ van R36

$\frac{1}{12}$ van R36 is dieselfde as $R36 \div 12 = R3$, dus $\frac{7}{12}$ van R36 is $7 \times R3 = R21$

B. $\frac{7}{12}$ van 36 vyftigstes

$\frac{1}{12}$ van 36 vyftigstes is dieselfde as $36 \text{ vyftigstes} \div 12 = 3 \text{ vyftigstes}$,

dus $\frac{7}{12}$ van 36 vyftigstes is $7 \times 3 \text{ vyftigstes} = 21 \text{ vyftigstes}$

$\frac{7}{12} \times \frac{36}{50}$ beteken $\frac{7}{12}$ van $\frac{36}{50}$; dit is presies dieselfde.

$\frac{1}{12}$ van $\frac{36}{50}$ is dieselfde as $\frac{36}{50} \div 12 = \frac{3}{50}$, dus $\frac{7}{12}$ van $\frac{36}{50}$ is $7 \times \frac{3}{50} = \frac{21}{50}$

3. (a) Jy het in die voorbeeld hier bo $\frac{7}{12} \times \frac{36}{50}$ bereken. Wat was die antwoord?

.....

(b) Bereken $\frac{7 \times 36}{12 \times 50}$ en vereenvoudig die antwoord.

.....

Voorbeeld:

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{8} = \frac{2}{3} \text{ van } \frac{15}{24} = \frac{1}{3} \text{ van } \frac{30}{24} = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}$$

Dieselfde antwoord word verkry met $\frac{2 \times 5}{3 \times 8}$

Om twee breuke te vermenigvuldig, maal jy bloot die tellers sowel as die noemers.

$$\frac{2}{3} \times \frac{9}{20} = \frac{2 \times 9}{3 \times 20} = \frac{18}{60} = \frac{3}{10}$$

Deel deur 'n breuk

Om deur 'n breuk te deel verg ander logika:

Indien daar 40 pizzas is, hoeveel leerdere kan elk $\frac{3}{5}$ van 'n pizza kry?

Die getal vyfdes in 40 pizzas: $40 \times 5 = 200$ vyfdes van 'n pizza.

Die aantal 3-vyfdes is dus $200 \div 3 = 66$ porsies van $\frac{3}{5}$ pizza, dan bly daar nog 2 vyfdes van 'n pizza oor.

Aangesien die porsie vir elke leerder 3 vyfdes van 'n pizza is, is die 2 vyfdes wat oorbly, 2 derdes van 'n porsie.

So, om $40 \div \frac{3}{5}$ te bereken het ons vermenigvuldig met **5** en gedeel deur **3** en dit gee **66 en twee-derdes porsies**.

Om die waarheid te sê, ons het $40 \times \frac{5}{3}$ bereken.

Deel is die inverse bewerking van vermenigvuldig.

Om dus deur 'n breuk te deel, vermenigvuldig jy met sy inverse.

Voorbeeld:

$$\frac{18}{60} \div \frac{2}{3} = \frac{18}{60} \times \frac{3}{2} = \frac{54}{120} = \frac{9}{20}$$

VERMENIGVULDIG MET EN DEEL DEUR BREUKE

1. Bereken elk van die volgende:

(a) $\frac{3}{4}$ van $\frac{12}{25}$

(b) $\frac{3}{4} \times \frac{12}{100}$

.....

.....

(c) $\frac{3}{4}$ van $\frac{13}{25}$

(d) $\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$

.....

.....

(e) $\frac{3}{20} \times \frac{5}{6}$

(f) $\frac{3}{20}$ van $\frac{3}{20}$

.....

.....

2. 'n Klein fabriek vervaardig koperpanne. Presies $\frac{3}{50}$ kg koper is nodig om een pan te vervaardig.

(a) Hoeveel panne kan vervaardig word as $\frac{18}{50}$ kg koper beskikbaar is?

.....

(b) Hoeveel panne kan vervaardig word as $\frac{20}{50}$ kg koper beskikbaar is?

.....

(c) Hoeveel panne kan vervaardig word as $\frac{2}{5}$ kg koper beskikbaar is?

.....

(d) Hoeveel panne kan vervaardig word as $\frac{3}{4}$ kg koper beskikbaar is?

.....

(e) Hoeveel panne kan vervaardig word as $\frac{144}{50}$ kg koper beskikbaar is?

.....

(f) Hoeveel panne kan vervaardig word as 5 kg koper beskikbaar is?

.....

3. Bereken:

(a) $\frac{18}{50} \div \frac{3}{50}$

(b) $\frac{9}{25} \div \frac{3}{50}$

.....
(c) $\frac{144}{50} \div \frac{3}{50}$

.....
(d) $2\frac{44}{50} \div \frac{3}{50}$

.....
(e) $2\frac{22}{25} \div \frac{3}{50}$

.....
(f) $\frac{5}{8} \div \frac{3}{50}$

.....
(g) $20 \div \frac{3}{50}$

.....
(h) $2 \div \frac{3}{50}$

.....
(i) $1 \div \frac{3}{50}$

.....
(j) $\frac{1}{2} \div \frac{3}{50}$

4. 'n Reghoek is $3\frac{5}{8}$ cm lank, en $2\frac{3}{5}$ cm breed.

(a) Wat is die oppervlakte van die reghoek?

.....
.....

(b) Wat is die omtrek van die reghoek?

.....
.....

5. 'n Reghoek is $5\frac{5}{6}$ cm lank, en sy oppervlakte is $8\frac{1}{6}$ cm².

Hoe breed is hierdie reghoek?

.....
.....

6. Bereken:

(a) $2\frac{3}{8}$ van $5\frac{4}{5}$

(b) $3\frac{2}{7} \times 2\frac{7}{12}$

.....

(c) $8\frac{2}{5} \div 3\frac{3}{10}$

(d) $3\frac{3}{10} \times 3\frac{3}{10}$

.....

(e) $2\frac{5}{8} \div 5\frac{7}{10}$

(f) $\frac{3}{5} \times 1\frac{2}{3} \times 1\frac{3}{4}$

.....

7. Bereken:

(a) $\frac{2}{3}(\frac{3}{4} + \frac{7}{10})$

(b) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{2}{3} \times \frac{7}{10}$

.....

(c) $\frac{5}{8}(\frac{4}{5} - \frac{1}{3})$

(d) $\frac{5}{8} \times \frac{4}{5} - \frac{5}{8} \times \frac{1}{3}$

.....

8. 'n Stuk grond met 'n oppervlakte van 40 ha word verdeel in 30 gelyke plotte. Die prys van die hele stuk grond is R45 000. (Onthou "ha" is die afkorting vir hektaar.)

(a) Jim koop $\frac{2}{5}$ van die grond.

(i) Hoeveel plotte is dit, en hoeveel behoort dit te kos?

.....

.....

(ii) Wat is die oppervlakte van die grond wat Jim koop?

.....

(b) Charlene koop $\frac{1}{3}$ van die grond. Hoeveel plotte is dit, en hoeveel behoort dit te kos?

.....

.....

- (c) Bongani koop die res van die grond. Bepaal die breuk van die grond wat hy koop.

.....

KWADRATE, DERDEMAGTE, VIERKANTS- EN DERDEMAGSWORTELS

1. Bereken:

(a) $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$

(b) $\frac{7}{10} \times \frac{7}{10}$

.....

.....

(c) $2\frac{5}{8} \times 2\frac{5}{8}$

(d) $1\frac{5}{12} \times 1\frac{5}{12}$

.....

.....

(e) $3\frac{5}{7} \times 3\frac{5}{7}$

(f) $10\frac{3}{4} \times 10\frac{3}{4}$

.....

.....

$\frac{9}{16}$ is die kwadraat van $\frac{3}{4}$, want $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$. $\frac{3}{4}$ is dus die vierkantswortel van $\frac{9}{16}$.

2. Vind die vierkantswortel van elk van die volgende getalle:

(a) $\sqrt{\frac{25}{49}}$

(b) $\sqrt{\frac{36}{121}}$

.....

.....

(c) $\sqrt{\frac{64}{25}}$

(d) $\sqrt{2\frac{46}{49}}$

.....

.....

3. Bereken.

(a) $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$

(b) $\frac{7}{10} \times \frac{7}{10} \times \frac{7}{10}$

.....

.....

(c) $\frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10}$

(d) $\frac{5}{8} \times \frac{5}{8} \times \frac{5}{8}$

.....

.....

4. Vind die derdemagswortel van elk van die volgende getalle:

(a) $\sqrt[3]{\frac{27}{1\,000}}$

(b) $\sqrt[3]{\frac{125}{216}}$

.....

(c) $\sqrt[3]{\frac{1\,000}{216}}$

(d) $\sqrt[3]{15\frac{5}{8}}$

.....

.....

3.4 Ekwivalente vorms

BREUKE, DESIMALE EN PERSENTASIES

1. Die reghoekige strook aan die regterkant is in klein deeltjies opgedeel.

(a) Hoeveel van hierdie deeltjies is daar in die reghoek?

(b) Hoeveel van hierdie deeltjies is daar in een tiende van die reghoek?

.....

(c) Watter breuk van die reghoek is blou?

.....

(d) Watter breuk van die reghoek is pienk?

.....


In plaas van “6 honderdstes” kan ons sê “6 persent” of, kortliks, “6%”. Dit beteken dieselfde. 15 persent van die reghoek hier regs is blou.

2. (a) Watter persentasie van die reghoek is groen?

.....

(b) Watter persentasie van die reghoek is pienk?

.....



0,37 en 37% en $\frac{37}{100}$ is **ekwivalente vorms** van dieselfde waarde (37 honderdstes).

3. Druk elk van die volgende op drie maniere uit: as 'n desimaal, 'n persentasie en 'n breuk (in eenvoudigste vorm):

(a) 3 tiendes

(b) 7 honderdstes

.....

.....

(c) 37 honderdstes

(d) 7 tiendes

.....

.....

(e) 2 vyfdes

(f) 7 twintigstes

.....

.....

4. Voltooi die tabel:

Desimaal	Persentasie	Gewone breuk (eenvoudigste vorm)
0,2		
	40%	
		$\frac{3}{8}$
0,05		

5. (a) Jannie eet 'n kwart van 'n waatlemoen. Watter persentasie van die waatlemoen is dit?

.....

(b) Sibu drink 75% van die melk in 'n bottel. Watter breukdeel van die melk in die bottel het hy gedrink?

.....

(c) Jem gebruik 0,18 van die verf in 'n blik. Indien hy die helfte van wat oorbly die volgende keer gebruik, watter breuk (in eenvoudigste vorm) bly oor?

.....

HOOFSTUK 4

Die desimale notasie vir breuke

In hierdie hoofstuk gaan jy met breuke werk wat in die desimale notasie geskryf is. Wanneer breuke in die desimale notasie geskryf is, kan ons berekeninge met hulle doen op dieselfde manier as wat ons berekeninge met telgetalle doen.

Dis belangrik om altyd in gedagte te hou dat die gewone breukvorm, die desimale vorm en die persentasievorm bloot verskillende maniere is om presies dieselfde getalle uit te druk. Hierdie getalle word rasionale getalle genoem.

4.1	Ekwivalente vorms.....	59
4.2	Berekeninge met desimale	61
4.3	Los probleme op	64
4.4	Meer probleme	66
4.5	Desimale in algebraïese uitdrukkings	68

$$\begin{aligned}
& 7 \times 1\,000\,000 \\
& \quad + \\
& 4 \times 100\,000 \\
& \quad + \\
& 7 \times 10\,000 \\
& \quad + \\
& 6 \times 1\,000 \\
& \quad + \\
& 3 \times 100 \\
& \quad + \\
& 6 \times 10 \\
& \quad + \\
& 9 \times 1 \\
& \quad + \\
& 3 \text{ tiendes} + 7 \text{ duizendstes} \\
& \quad + \\
& \frac{3}{10\,000} + \frac{8}{100\,000} + \frac{7}{1\,000\,000}
\end{aligned}$$

4 Die desimale notasie vir breuke

4.1 Ekwivalente vorms

Desimale breuke en gewone breuke is bloot verskillende maniere om dieselfde getal uit te druk. Dit is verskillende **notasies** wat dieselfde waarde wys.

Om 'n desimale getal as 'n gewone breuk te skryf:

Skryf die desimale getal as 'n gewone breuk met 'n noemer wat 'n mag van tien is (10, 100, 1 000, ens.) en vereenvoudig dit dan indien moontlik, byvoorbeeld

$$0,35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20} \times \frac{5}{5} = \frac{7}{20}$$

Om 'n gewone breuk as 'n desimale getal te skryf:

Verander die gewone breuk na 'n ekwivalente breuk met 'n mag van tien as 'n noemer, byvoorbeeld

$$\frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{25}{25} = \frac{75}{100} = 0,75$$

As jy jou sakrekenaar mag gebruik, tik net $3 \div 4$ in en die antwoord sal as 0,75 gegee word. Op party sakrekenaars sal jy 'n addisionele knoppie moet druk om die presiese breuk na 'n desimaal te herlei.

Notasie beteken 'n stel simbole om iets op 'n spesiale manier te wys.

GEWONE BREUKE, DESIMALE EN PERSENTASIES

In hierdie oefening mag jy nie 'n sakrekenaar gebruik nie.

1. Skryf die volgende desimale as gewone breuke in hulle eenvoudigste vorm:

(a) 0,56

(b) 3,87

.....

(c) 1,9

(d) 5,205

.....

2. Skryf die volgende gewone breuke as desimale:

(a) $\frac{9}{20}$

(b) $\frac{7}{5}$

.....
(c) $\frac{24}{25}$

.....
(d) $2\frac{3}{8}$

3. Skryf die volgende persentasies as gewone breuke in hulle eenvoudigste vorm:

(a) 70%

(b) 5%

(c) 12,5%

.....

4. Skryf die volgende desimale as persentasies:

(a) 0,6

(b) 0,43

(c) 0,08

.....

(d) 0,265

(e) 0,005

.....

5. Skryf die volgende gewone breuke as persentasies:

(a) $\frac{7}{10}$

(b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{33}{50}$

.....

(d) $\frac{60}{60}$

(e) $\frac{2}{25}$

(f) $\frac{29}{50}$

.....

6. Jane en Devi is in verskillende skole. By Jane se skool was die jaarpunt vir Wiskunde uit 80, en Jane het 60 uit 80 gekry. By Devi se skool was die jaarpunt uit 50 en Devi het 40 uit 50 gekry.

(a) Watter breuk van die totale punte, in eenvoudigste vorm, het Devi gekry?

.....

(b) Watter persentasie het Devi en Jane vir Wiskunde gekry?

.....

(c) Wie het die beste presteer, Jane of Devi?

.....

7. Tydens 'n korfbalwedstryd het Lebo twaalf keer probeer om 'n doel aan te teken. Net vier van haar pogings was suksesvol.

(a) Watter breuk van haar pogings was suksesvol?

.....

.....

(b) Watter persentasie van haar pogings was nie suksesvol nie?

.....

4.2 Berekeninge met desimale

Wanneer jy desimale optel en aftrek:

Tel tiendes by tiendes.

Trek tiendes van tiendes af.

Tel honderdstes by honderdstes.

Trek honderdstes van honderdstes af.

En so aan!

Wanneer jy desimale vermenigvuldig, verander jy die desimale na telgetalle, doen die berekening en verander hulle weer terug na desimale.

Voorbeeld: Om $13,1 \times 1,01$ te bereken, bereken jy eers 131×101 (wat gelyk is aan 13 231). Dan, aangesien jy die 13,1 met 10 vermenigvuldig het, en die 1,01 met 100 om hulle telgetalle te maak, moet jy hierdie antwoord deur 10×100 (d.w.s. 1 000) deel.

Die finale antwoord is dus 13,231.

Wanneer jy desimale deel, kan jy ekwivalente breuke gebruik om jou te help.

Voorbeeld: $21,7 \div 0,7 = \frac{21,7}{0,7} = \frac{21,7}{0,7} \times \frac{10}{10} = \frac{217}{7} = 31$

Let op hoe jy beide die teller en noemer van die breuk met dieselfde getal vermenigvuldig (in hierdie geval, 10). Vermenigvuldig altyd met die *kleinste* mag van 10 wat albei waardes telgetalle sal maak.

BEREKENINGE MET DESIMALE

Jy mag nie in hierdie oefening 'n sakrekenaar gebruik nie. Maak seker dat jy alle stappe van jou berekening wys.

1. Bereken die waarde van die volgende:

(a) $3,3 + 4,83$

(b) $0,6 + 18,3 + 4,4$

.....

.....

.....

(c) $9,3 + 7,6 - 1,23$

(d) $(16,0 - 7,6) - 0,6$

.....

.....

(e) $9,43 - (3,61 + 1,14)$

(f) $1,21 + 2,5 - (2,3 - 0,23)$

.....

.....

.....

2. Bereken die waarde van die volgende:

(a) $4 \times 0,5$

(b) $15 \times 0,02$

(c) $0,8 \times 0,04$

.....

(d) $0,02 \times 0,15$

(e) $1,07 \times 0,2$

(f) $0,016 \times 0,02$

.....

3. Bereken die waarde van die volgende:

(a) $7,2 \div 3$

(b) $12 \div 0,3$

(c) $0,15 \div 0,5$

.....

.....

(d) $10 \div 0,002$

(e) $0,3 \div 0,006$

(f) $0,024 \div 0,08$

.....

.....

4. Omkring die waarde wat gelyk aan of die naaste aan die antwoord op elke berekening is:

(a) $3 \times 0,5$

(b) $4,4 \div 0,2$

A: 6

A: 8,8

B: 1,5

B: 2,2

C: 0,15

C: 22


(c) $56 \times 1,675$

A: meer as 56

B: meer as 84

C: meer as 112

5. Bepaal die operator en die onbekende getalle in die vloeiagram, en vul hulle in:



6. Bereken die volgende:

(a) $(0,1)^2$

(b) $(0,03)^2$

(c) $(2,5)^2$

.....

(d) $\sqrt{0,04}$

(e) $\sqrt{0,16}$

(f) $\sqrt{0,49}$

.....

.....

.....

(g) $(0,2)^3$

(h) $(0,4)^3$

(i) $(0,03)^3$

.....

.....

.....

(j) $\sqrt[3]{0,064}$

(k) $\sqrt[3]{0,125}$

(l) $\sqrt[3]{0,216}$

.....

.....

.....

7. Bereken die volgende:

(a) $2,5 \times 2 \div 10$

(b) $4,2 - 5 \times 1,2$

.....

.....

.....

.....

(c) $\frac{5,4 + 7,35}{0,05}$

(d) $4,2 \div 0,21 + 0,45 \times 0,3$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.3 Los probleme op

ALLERHANDE SOORTE PROBLEME

Jy mag nie in hierdie oefening 'n sakrekenaar gebruik nie. Maak seker dat jy al die stappe van jou werk wys.

1. Is $6,54 \times 0,81 = 0,654 \times 8,1$? Verduidelik jou antwoord.

.....

.....

.....

2. Daar word vir jou gesê dat $45 \times 24 = 1\ 080$. Gebruik dit om die volgende te bepaal:

(a) $4,5 \times 2,4$

(b) $4,5 \times 24$

(c) $4,5 \times 0,24$

.....

.....

.....

(d) $0,045 \times 24$

(e) $0,045 \times 0,024$

(f) $0,045 \times 24$

.....

3. Sonder om te deel, kies watter antwoord tussen hakies die korrekte antwoord, of die naaste aan die korrekte antwoord is.

(a) $14 \div 0,5$ (7; 28; 70)

(b) $0,58 \div 0,7$ (8; 80; 0,8)

.....

(c) $2,1 \div 0,023$ (10; 100; 5)

.....

4. (a) John word gevra om $6,5 \div 0,02$ te bereken. Hy doen die volgende:

Stap 1: $6,5 \div 2 = 3,25$

Stap 2: $3,25 \times 100 = 325$

Is hy reg? Waarom?

.....

.....

.....

.....

(b) Gebruik John se metode in (a) hier bo om die volgende te bereken:

(i) $4,8 \div 0,3$

(ii) $21 \div 0,003$

.....

.....

5. Gegewe: $0,174 \div 0,3 = 0,58$. Gebruik hierdie feit om die antwoorde vir die volgende neer te skryf sonder om enige verdere berekeninge te doen:

(a) $0,3 \times 0,58$

(b) $1,74 \div 3$

.....

(c) $17,4 \div 30$

(d) $174 \div 300$

.....

(e) $0,0174 \div 0,03$

(f) $0,3 \times 5,8$

.....

4.4 Meer probleme

MEER PROBLEME EN BEREKENINGE

Jy mag 'n sakrekenaar gebruik vir hierdie oefening.

1. Bereken die volgende en rond alle antwoorde korrek tot 2 desimale plekke af:

(a) $8,567 + 3,0456$

(b) $2,781 - 6,0049$

.....

.....

(c) $1,234 \times 4,056$

(d) $\frac{5,678 + 3,245}{1,294 - 0,994}$

.....

.....

2. Wat is die verskil tussen 0,890 en 0,581?

.....

3. 'n Reghoek is 12,34 cm breed en 31,67 cm lank.

(a) Wat is die omtrek van die reghoek?

.....

.....

(b) Wat is die oppervlakte van die reghoek? Rond jou antwoord tot twee desimale plekke af.

.....

.....

4. Alison koop 'n koeldrank vir R5,95, 'n sjokolade vir R3,25 en 'n pakkie skyfies vir R4,60. Sy betaal met 'n R20-noot.

(a) Hoeveel het sy bestee?

.....

.....

(b) Hoeveel kleingeld het sy gekry?

.....

.....

5. 'n Trekker gebruik 11,25 ℓ brandstof in 0,75 uur. Hoeveel liter gebruik dit in een uur?

.....
.....

6. Mevrouw Ruka het haar munisipale rekening ontvang.

(a) Haar waterverbruik vir een maand kos R32,65. Die eerste 5,326 kl is gratis en daarna betaal sy R5,83 per kiloliter.

Hoeveel water het die Ruka-huishouding gebruik?

.....
.....

(b) Mevrouw Ruka se elektrisiteitsheffing vir dieselfde maand was R417,59. Die eerste 10 kWh is gratis. Vir die volgende 100 kWh is die koste R1,13 per kWh, en daarna is die koste vir elke kWh R1,42. Hoeveel elektrisiteit het die Ruka-huishouding gebruik?

.....
.....
.....

7. 'n Rol rokmateriaal is 25 m lank. Jy het 1,35 m materiaal nodig om een rok te maak. Hoeveel rokke kan uit die rol materiaal gemaak word en hoeveel materiaal bly oor?

.....
.....
.....

8. As 1 liter petrol 0,679 kg weeg, wat sal 28,6 ℓ petrol weeg?

.....

9. Die lesing op 'n watermeter is 321,573 kl aan die begin van die maand. Aan die einde van die maand is die lesing 332,523 kl. Hoeveel water is in hierdie maand gebruik, in ℓ?

.....
.....

4.5 Desimale in algebraïese uitdrukking en vergelyking

DESIMALE IN ALGEBRA

1. Vereenvoudig die volgende:

(a) $\sqrt{0,09x^{36}}$

.....

.....

(c) $(2,4x^2y^3)(10y^3x)$

.....

.....

(e) $\frac{3,4x-1,2x}{1,1x \times 4}$

.....

.....

.....

(g) $3x^2 + 0,1x^2 - 45,6 + 3,9$

.....

.....

.....

(b) $7,2x^3 - 10,4x^3$

.....

.....

(d) $11,75x^2 - 1,2x \times 5x$

.....

.....

(f) $\sqrt[3]{0,008x^{12}} + \sqrt{0,16x^8}$

.....

.....

.....

(h) $\frac{0,4y+1,2y}{0,6x-3x}$

.....

.....

.....

2. Vereenvoudig die volgende:

(a) $\frac{0,5x^9}{0,02x^3}$

.....

.....

(b) $\frac{0,325}{x^2} - \frac{1,675}{x^2}$

.....

.....

(c) $\frac{3,6x}{1,5y^3} \times \frac{5y}{0,6x}$

(d) $\frac{9,5x^2}{1,2y^2} \div \frac{0,05x}{0,04y^8}$

.....

.....

.....

3. Los die volgende vergelykings op:

(a) $0,24 + x = 0,31$

(b) $x + 5,61 = 7,23$

.....

.....

.....

(c) $x - 3,14 = 9,87$

(d) $4,21 - x = 2,74$

.....

.....

.....

(e) $0,96x = 0,48$

(f) $x \div 0,03 = 1,5$

.....

.....

.....

WERKBLAD

Jy mag nie 'n sakrekenaar gebruik nie, behalwe vir vraag 5. Maak seker dat jy al die stappe in jou werk wys, waar van toepassing.

1. Voltooi die volgende tabel:

Persentasie	Gewone breuk	Desimaal
2,5%		
	$\frac{15}{250}$	
		0,009

2. Bereken die volgende:

(a) $6,78 - 4,92$

(b) $1,7 \times 0,05$

(c) $7,2 \div 0,36$

.....

(d) $4,2 - 0,4 \times 1,2 + 7,37$

(e) $(0,12)^2$

(f) $\frac{\sqrt[3]{0,04}}{\sqrt[3]{0,027}}$

.....

.....

3. $36 \times 19 = 684$. Gebruik hierdie resultaat om die volgende te bepaal:

(a) $3,6 \times 1,9$

(b) $0,036 \times 0,19$

(c) $68,4 \div 0,19$

.....

4. Vereenvoudig:

(a) $(4,95x - 1,2) - (3,65x + 3,1)$

(b) $\frac{2,75x^{50}}{0,005x^{25}}$

.....

.....

5. Mulalo het winkel toe gegaan en 2 buisies tandepasta vir R6,98 elk, 3 blikkies koeldrank vir R6,48 elk, en 5 blikkies sousbone vir R7,95 elk gekoop. Hoeveel kleingeld het hy gekry, as hy met 'n R100-noot betaal het?

.....

DIE DESIMALE NOTASIE VIR BREUKE

HOOFSTUK 5

EkspONENTE

In hierdie hoofstuk sal jy werk oor eksponente wat jy in vorige grade gedoen het, hersien. Jy sal ook leer wat gebeur wanneer 'n getal tot 'n mag wat 'n negatiewe getal is, verhef word en jy sal ook eenvoudige vergelykings in eksponensiële vorm oplos.

In Graad 8 het jy van wetenskaplike notasie geleer. In hierdie hoofstuk sal ons die wetenskaplike notasie uitbrei om baie klein getalle soos 0,0000123 in te sluit.

5.1	Hersiening.....	73
5.2	Heelgetaleksponente.....	77
5.3	Los eenvoudige eksponensiële vergelykings op.....	80
5.4	Wetenskaplike notasie	82

5 Eksponente

5.1 Hersiening

Jy weet reeds dat eksponente 'n kort manier is om herhaalde vermenigvuldiging van dieselfde getal met homself te beskryf, byvoorbeeld $5 \times 5 \times 5 = 5^3$. Die **eksponent**, wat in hierdie voorbeeld 3 is, staan vir hoeveel keer die waarde vermenigvuldig word. Die getal wat vermenigvuldig word, wat in hierdie voorbeeld 5 is, word die **grondtal** genoem.

As daar gemengde bewerkings is, moet die magte voor vermenigvuldiging en deling bereken word, byvoorbeeld $5^2 \times 3^2 = 25 \times 9$.

Jy het in vorige grade ook oor die eienskappe van eksponente geleer:

Eienskap	Voorbeeld
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$3^2 \times 3^3 = 3^{2+3} = 3^5$
$a^m \div a^n = a^{m-n}$	$5^4 \div 5^2 = 5^{4-2} = 5^2$
$(a^m)^n = a^{m \times n}$	$(2^3)^2 = 2^{2 \times 3} = 2^6$
$(a \times t)^n = a^n \times t^n$	$(3 \times 4)^2 = 3^2 \times 4^2$
$a^0 = 1$	$32^0 = 1$

DIE EKSPONENSIËLE VORM VAN 'N GETAL

1. Skryf die volgende in eksponensiële notasie:

(a) $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ (b) $s \times s \times s \times s$ (c) $(-6) \times (-6) \times (-6)$

.....
 (d) $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times s \times s \times s \times s$ (e) $3 \times 3 \times 3 \times 7 \times 7$ (f) $500 \times (1,02) \times (1,02)$

.....

2. Skryf elkeen van die getalle in eksponensiële notasie, op 'n paar verskillende maniere indien moontlik:

(a) 81 (b) 125 (c) 1 000

.....
 (d) 64 (e) 216 (f) 1 024

.....

VOLGORDE VAN BEWERKINGS

1. Bereken die waarde van $7^2 - 4$.

Bathabile het die berekening soos volg gedoen: $7^2 - 4 = 14 - 4 = 10$

Nathaniel het die berekening anders gedoen: $7^2 - 4 = 49 - 4 = 45$

Watter leerder het die berekening korrek gedoen? Gee redes vir jou antwoord.

.....
.....

2. Bereken $5 + 3 \times 2^2 - 10$, met verduidelikings.

.....
.....
.....
.....

3. Verduidelik hoe om $2^6 - 6^2$ te bereken.

.....
.....
.....

4. Verduidelik hoe om $(4 + 1)^2 + 8 \times \sqrt[3]{64}$ te bereken.

.....
.....
.....
.....
.....

EIENSKAPPE VAN EKSPONENTE

1. Gebruik die eienskappe van eksponente om die volgende te bereken:

(a) $2^2 \times 2^4$

(b) $3^4 \div 3^2$

(c) $3^0 + 3^4$

.....
.....
.....

- (d) $(2^3)^2$ (e) $(2 \times 5)^2$ (f) $(2^2 \times 7)^3$
-
-
-

2. Voltooi die tabel. Vervang y met die gegewe getal. Die eerste kolom is as voorbeeld gedoen.

	y	2	3	4	5
(a)	$y \times y^4$	2×2^4 $= 2^{1+4}$ $= 2^5$ $= 32$			
(b)	$y^2 \times y^3$	$2^2 \times 2^3$ $= 4 \times 8$ $= 32$			
(c)	y^5	$2^5 = 32$			

3. Is die uitdrukking $y \times y^4$ en $y^2 \times y^3$ en y^5 ekwivalent? Verduidelik.

.....

.....

.....

4. Voltooi die tabel. Vervang y met die gegewe getal.

	y	2	3	4	5
(a)	$y^4 \div y^2$	$2^4 \div 2^2$ $= 16 \div 4$ $= 4$			
(b)	$y^3 \div y^1$	$2^3 \div 2^1$ $= 8 \div 2$ $= 4$			
(c)	y^2	$2^2 = 4$			

5. (a) Is $y^4 \div y^2 = y^3 \div y^1 = y^2$ volgens die tabel? Verduidelik waarom dit so is.

.....

(b) Evalueer $y^4 \div y^2$ vir $y = 15$.

.....

6. Voltooi die tabel:

x	2	3	4	5
(a) 2×5^x	2×5^2 $= 2 \times 25$ $= 50$			
(b) $(2 \times 5)^x$	$(2 \times 5)^2$ $= 10^2$ $= 100$			
(c) $2^x \times 5^x$	$2^2 \times 5^2$ $= 4 \times 25$ $= 100$			

7. (a) Volgens die tabel hier bo, is $2 \times 5^x = (2 \times 5)^x$? Verduidelik waarom dit so is.

.....

(b) Watter uitdrukkings in die tabel in vraag 6 is ekwivalent? Verduidelik.

.....

8. Hier onder is berekeninge wat Wilson as huiswerk gedoen het. Merk elke probleem as korrek of verkeerd en verduidelik die foute.

(a) $b^3 \times b^8 = b^{24}$

.....

(b) $(5x)^2 = 5x^2$

.....

.....

(c) $(-6a) \times (-6a) \times (-6a) = (-6a)^3$

.....

5.2 Heelgetaleksponente

Tot dusver het jy slegs met positiewe eksponente gewerk. Maar wat gebeur wanneer 'n getal tot 'n mag wat 'n negatiewe getal is, verhef word? Wat beteken x^{-5} byvoorbeeld?

Ons wil hê die eienskap vir vermenigvuldiging van magte moet geld, byvoorbeeld

$$x^5 \times x^{-5} = x^{5-5} = x^0 = 1.$$

Omdat $x^5 \times x^{-5} = 1$, weet ons dat x^{-5} die vermenigvuldigingsinverses van x^5 is.

$$x^5 \times \frac{1}{x^5} = 1 \text{ as } x \neq 0.$$

$$\text{Dus is } x^{-5} = \frac{1}{x^5}$$

Net so moet die eienskap vir deling van magte geld, byvoorbeeld $\frac{x^3}{x^5} = x^{3-5} = x^{-2}$

Maar ons weet dat $\frac{x^3}{x^5} = \frac{1}{x^2}$ as $x \neq 0$. Dus is $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$.

Ons definieer $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ vir $x \neq 0$, n is 'n natuurlike getal.

NEGATIEWE EKSPONENTE

1. Voltooi die getalpatrone in die tabel:

(a)	$2^4 = 16$	$3^4 = 81$	$4^4 = 256$	$5^4 = 625$
(b)	$2^3 = 8$	$3^3 = 27$	$4^3 = 64$	$5^3 = 125$
(c)	$2^2 = 4$	$3^2 = 9$	$4^2 = 16$	$5^2 = 25$
(d)	$2^1 = 2$	$3^1 = 3$	$4^1 = 4$	$5^1 = 5$
(e)	$2^0 =$	$3^0 =$	$4^0 =$	$5^0 =$
(f)	$2^{-1} =$	$3^{-1} =$	$4^{-1} =$	$5^{-1} =$
(g)	$2^{-2} =$	$3^{-2} =$	$4^{-2} =$	$5^{-2} =$
(h)	$2^{-3} =$	$3^{-3} =$	$4^{-3} =$	$5^{-3} =$

2. Wat moet die betekenis van a^0 en a^{-1} wees om die struktuur van patrone in die tabel te behou?

.....

3. (a) Gebruik 'n wetenskaplike sakrekenaar om die desimale waardes van die gegewe magte te bepaal.

Voorbeeld: Om 3^{-1} te bepaal, gebruik die sleutelvolgorde: **3 y^x 1 ± =**

Mag	2^{-1}	5^{-1}	$(-2)^{-1}$	$(0,3)^{-1}$	0^{-1}	10^{-1}	10^{-2}
Desimale waarde							

(b) Verduidelik die betekenis van 10^{-3} .

.....

4. Bepaal die waarde van elkeen van die volgende op twee maniere:

A. Deur die definisie van magte te gebruik (byvoorbeeld $5^2 \times 5^0 = 25 \times 1 = 25$).

B. Deur die eienskappe van eksponente te gebruik (byvoorbeeld $5^2 \times 5^0 = 5^{2+0} = 5^2 = 25$).

(a) $(3^3)^{-2}$

(b) $4^2 \times 4^{-2}$

(c) $5^{-2} \times 5^{-1}$

Eerste manier:

.....

.....

.....

Tweede manier:

.....

.....

.....

.....

5. Bereken die waarde van elkeen van die volgende. Druk jou antwoorde as gewone breuke uit.

(a) 2^{-3}

(b) $3^2 \times 3^{-2}$

(c) $(2 + 3)^{-2}$

.....

(d) $3^{-2} \times 2^{-3}$

(e) $2^{-3} + 3^{-3}$

(f) 10^{-3}

.....

(g) $2^3 + 2^{-3}$

(h) $(3^{-1})^{-1}$

(i) $(2^{-3})^2$

.....

6. Watter van die volgende is waar? Korrigeer enige stelling wat onwaar is.

(a) $6^{-1} = -6$

(b) $3x^{-2} = \frac{1}{3x^2}$

(c) $3^{-1}x^{-2} = \frac{1}{3x^2}$

.....

(d) $(ab)^{-2} =$

(e) $=$

(f) $= 3$

.....

5.3 Los eenvoudige eksponensiële vergelykings op

'n Eksponensiële vergelyking is 'n vergelyking waarin die veranderlike deel van die eksponent is. Wanneer jy dus eksponensiële vergelykings oplos, los jy vrae op van die vorm: **“Tot watter mag moet die grondtal verhef word sodat die bewering waar is?”**

Om hierdie soort vergelyking op te los, moet jy die volgende onthou:

$$\text{As } a^m = a^n, \text{ dan is } m = n.$$

Met ander woorde, as die grondtal aan weerskante van die vergelyking dieselfde is, is die eksponente dieselfde.

Voorbeeld:

$$3^x = 243$$

$$3^x = 3^5 \quad (\text{herskryf deur dieselfde grondtal te gebruik})$$

$$x = 5 \quad (\text{aangesien die grondtalle dieselfde is, stel ons die eksponente gelyk})$$

Party eksponensiële vergelykings is effens meer ingewikkeld:

Voorbeeld: $3^{x+3} = 243$

$$3^{x+3} = 3^5 \quad (\text{herskryf deur dieselfde grondtal te gebruik})$$

$$x + 3 = 5 \quad (\text{stel die eksponente gelyk})$$

$$x = 2$$

Kontroleer: LK $3^{2+3} = 3^5 = 243$

Onthou dat die eksponent ook negatief kan wees. Om sulke vergelykings op te los, volg jy egter dieselfde metode.

Voorbeeld: $2^x = \frac{1}{32}$

$$2^x = 2^{-5} \quad (\text{herskryf deur dieselfde grondtal te gebruik})$$

$$x = -5 \quad (\text{stel die eksponente gelyk})$$

LOS EKSPONENSIËLE VERGELYKINGS OP

1. Gebruik die tabel om die vrae wat volg te beantwoord.

x	2	3	4	5
2^x	4	8	16	32
3^x	9	27	81	243
5^x	25	125	625	3 125

Vir watter waarde van x geld die volgende?

(a) $2^x = 32$

(b) $3^x = 81$

(c) $5^x = 3\,125$

.....

.....

.....

(d) $2^x = 8$

(e) $5^x = 625$

(f) $3^x = 9$

.....

.....

.....

(g) $5^{x+1} = 25$

(h) $3^{x+2} = 27$

(i) $2^{x-1} = 8$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Los die eksponensiële vergelykings op. Jy kan jou sakrekenaar gebruik indien nodig.

(a) $4^x = \frac{1}{64}$

(b) $6^{2x} = 1\,296$

(c) $2^{x-1} = \frac{1}{8}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(d) $3^{x+2} = \frac{1}{729}$

(e) $5^{x+1} = 15\,625$

(f) $2^{x+3} = \frac{1}{4}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(g) $4^{x+3} = \frac{1}{256}$

(h) $3^{2-x} = 81$

(i) $5^{3x} = \frac{1}{125}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.4 Wetenskaplike notasie

Wetenskaplike notasie is 'n manier om getalle te skryf wat te groot of te klein is om duidelik in desimale vorm geskryf te word. Die middellyn van 'n waterstofatoom is byvoorbeeld 'n baie klein getal. Dit is 0,000000053 mm. Die afstand van die Son na die Aarde is gemiddeld 150 000 000 km.

In wetenskaplike notasie word die middellyn van die waterstofatoom geskryf as $5,3 \times 10^{-8}$ en die gemiddelde afstand van die Son na die Aarde as $1,5 \times 10^8$. Dit is makliker om getalle soos hierdie te vergelyk en te bereken, aangesien dit baie lastig is om die nulle te tel wanneer jy met sulke getalle werk.

Beskou die voorbeelde hieronder:

Desimale notasie	Wetenskaplike notasie
6 130 000	$6,13 \times 10^6$
0,00001234	$1,234 \times 10^{-5}$

'n Getal wat in wetenskaplike notasie geskryf word, word as die produk van twee getalle geskryf in die vorm $\pm a \times 10^n$ waar a 'n desimale getal tussen 1 en 10 en n 'n heelgetal is.

Enige getal kan in wetenskaplike notasie geskryf word, byvoorbeeld:

$$40 = 4,0 \times 10$$

$$2 = 2 \times 10^0$$

Die desimale getal 324 000 000 word in wetenskaplike notasie as $3,24 \times 10^8$ geskryf, omdat die desimale komma 8 plekke na links geskuif word om die getal 3,24 te vorm.

Die desimale getal 0,00000065 in wetenskaplike notasie geskryf, is $6,5 \times 10^{-7}$, omdat die desimale komma 7 plekke na regs geskuif word om die getal 6,5 te vorm.

SKRYF BAIE KLEIN EN BAIE GROOT GETALLE

1. Druk die volgende getalle uit in wetenskaplike notasie:

(a) 134,56

(b) 0,0000005678

.....

(c) 876 500 000

(d) 0,0000000000321

.....

(e) 0,006789

(f) 89 100 000 000 000

.....

(g) 0,001

(h) 100

.....

2. Druk die volgende getalle uit in gewone desimale notasie:

(a) $1,234 \times 10^6$

(b) 5×10^{-1}

.....

(c) $4,5 \times 10^5$

(d) $6,543 \times 10^{-11}$

.....

3. Waarom sê ons dat 34×10^3 nie in wetenskaplike notasie geskryf is nie? Herskryf dit in wetenskaplike notasie.

.....

4. Is elkeen van hierdie getalle in wetenskaplike notasie geskryf? Indien nie, herskryf dit sodat dit in wetenskaplike notasie is.

(a) $90,3 \times 10^{-5}$

(b) 100×10^2

(c) $1,36 \times 10^5$

.....

.....

(d) $2,01 \times 10^{-2}$

(e) $0,01 \times 10^3$

(f) $0,6 \times 10^8$

.....

.....

BEREKENINGE DEUR WETENSKAPLIKE NOTASIE TE GEBRUIK

Voorbeeld: $123\,000 \times 4\,560\,000$

$$= 1,23 \times 10^5 \times 4,56 \times 10^6$$

(skryf in wetenskaplike notasie)

$$= 1,23 \times 4,56 \times 10^5 \times 10^6$$

(vermenigvuldiging is kommutatief)

$$= 5,6088 \times 10^{11}$$

(gebruik 'n sakrekenaar om die desimale te vermenigvuldig, maar tel die magte in jou kop bymekaar)

1. Gebruik wetenskaplike notasie om elkeen van die volgende te bereken. Gee die antwoord in wetenskaplike notasie.

(a) $135\,000 \times 246\,000\,000$

(b) $987\,654 \times 123\,456$

.....

(c) $0,000065 \times 0,000216$

(d) $0,000000639 \times 0,0000587$

.....

Voorbeeld: $5 \times 10^3 + 4 \times 10^4$

$$= 0,5 \times 10^4 + 4 \times 10^4$$

(vorm gelyksoortige terme)

$$= 4,5 \times 10^4$$

(kombineer gelyksoortige terme)

2. Bereken die volgende. Laat die antwoord in wetenskaplike notasie.

(a) $7,16 \times 10^5 + 2,3 \times 10^3$

(b) $2,3 \times 10^{-4} + 6,5 \times 10^{-3}$

.....

(c) $4,31 \times 10^7 + 1,57 \times 10^6$

(d) $6,13 \times 10^{-10} + 3,89 \times 10^{-8}$

.....

HOOFSTUK 6

Patrone

In hierdie hoofstuk sal jy leer van verskillende soorte getalpatrone. Party getalpatrone word binne meetkundige patrone aangetref. Jy sal leer om te identifiseer hoe patrone gevorm word en jy sal patrone van jou eie maak. Jy sal ook leer om formules te maak wat gebruik kan word om getalpatrone te beskryf.


6.1	Meetkundige patrone.....	87
6.2	Nog patrone	91
6.3	Verskillende soorte patrone in getallerye.....	93
6.4	Formules vir getallerye	96

1	2	3	5	8	13	21	34	55
2	3	5	8	13	21	34	55	89
3	5	8	13	21	34	55	89	144
5	8	13	21	34	55	89	144	233
8	13	21	34	55	89	144	233	377
13	21	34	55	89	144	233	377	610
21	34	55	89	144	233	377	610	987
34	55	89	144	233	377	610	987	1597
55	89	144	233	377	610	987	1597	2584
89	144	233	377	610	987	1597	2584	4181
144	233	377	610	987	1597	2584	4181	6765
233	377	610	987	1597	2584	4181	6765	10946
377	610	987	1597	2584	4181	6765	10946	17711
610	987	1597	2584	4181	6765	10946	17711	28657
987	1597	2584	4181	6765	10946	17711	28657	46368


6 Patrone

6.1 Meetkundige patrone


ONDERSOEK EN BREI UIT



Rangskikking 1



Rangskikking 2



Rangskikking 3



Rangskikking 4

1. Blou en geel vierkantige teëls word gebruik om die rangskikkings hier bo te vorm.

(a) Hoeveel geel teëls is daar in elke rangskikking?

.....

(b) Hoeveel blou teëls is daar in elke rangskikking?


.....

(c) As nog rangskikkings op dieselfde manier gemaak word, hoeveel blou teëls en hoeveel geel teëls sal daar in rangskikking 5 wees? Kontroleer jou antwoord deur die rangskikking op die rooster aan die regterkant te teken.

.....

(d) Voltooi hierdie tabel.

Getal geel teëls	1	2	3	4	5	8
Getal blou teëls						



(e) Hoeveel blou teëls sal daar in 'n soortgelyke rangskikking met 26 geel teëls wees?

.....

(f) Hoeveel blou teëls sal daar in 'n soortgelyke rangskikking met 100 geel teëls wees?

.....

(g) Beskryf hoe jy gedink het om jou antwoord vir (f) te kry.

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

.....


2. (a) In hierdie rangskikkings is daar rooi teëls ook. Voltooi die tabel.




Rangskikking 1



Rangskikking 2



Rangskikking 3



Rangskikking 4

Getal blou teëls	1	2	3	4	5	6	7
Getal geel teëls							
Getal rooi teëls							

(b) Hoeveel rooi teëls is daar in elke rangskikking?

.....

(c) Hoeveel geel teëls is daar in elke rangskikking?

.....


Die getal rooi teëls in rangskikkings soos dié in vraag 2 is **konstant**. Dit is altyd 4, ongeag die getal blou en geel teëls wat daar is.

Die getal blou teëls is verskillend vir verskillende rangskikkings. Ons kan sê die getal blou teëls **verander**. Ons kan ook sê die getal blou teëls is 'n **veranderlike**.

3. Is die getal geel teëls in die rangskikkings hier bo 'n konstante of is dit 'n veranderlike?

.....

4. Kyk na hierdie drie rangskikkings. Hulle bestaan uit swart vierkante, grys vierkante en wit vierkante.



(a) Teken nog 'n rangskikking van dieselfde soort, maar met 'n ander lengte, op die rooster hier regs.


(b) Beskryf wat konstant is in hierdie rangskikkings.

.....

(c) Wat is die veranderlikes in hierdie rangskikkings?

.....

.....



Die kleinste rangskikking hier bo kan rangskikking 1 genoem word, die volgende groter een kan rangskikking 2 genoem word, ensovoorts.

5. (a) Voltooi die tabel vir rangskikkings soos dié in vraag 4.

Rangskikkingnommer	1	2	3	4	5	6	7	10	20
Getal swart vierkante									
Getal grys vierkante									
Getal wit vierkante									

(b) Hoeveel grys vierkante dink jy sal daar in rangskikking 15 wees? Verduidelik jou antwoord.

.....

.....

(c) Hoeveel swart vierkante dink jy sal daar in rangskikking 15 wees? Verduidelik jou antwoord.

.....

(d) Hoeveel wit vierkante dink jy sal daar in rangskikking 15 wees? Verduidelik jou antwoord.

.....


Die getal grys vierkante in die onderskeie rangskikkings in vraag 4 vorm 'n patroon: 4; 8; 12; 16; 20; 24; . . . , en so aan.

Die getal wit vierkante in die onderskeie rangskikkings vorm ook 'n patroon: 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; . . . , en so aan.

6. Wat is die volgende vyf getalle in elkeen van die patrone hier bo?

.....

7. (a) Teken die volgende rangskikking wat dieselfde patroon volg.



(b) Hoeveel swart teëls is daar in die rangskikking wat jy geteken het?

(c) Hoeveel swart teëls sal daar in elkeen van die volgende vier rangskikkings wees?

.....

NOG IETS OM TE DOEN


Kyk weer na die rangskikkings in vraag 4 en 5. As daar 20 grys teëls in so 'n rangskikking is, hoeveel wit teëls is daar? Skryf jou antwoord in die tabel hier onder in. Voltooi ook die tabel.

Getal grys vierkante	20	36	52			
Getal wit vierkante				256	225	625

6.2 Nog patrone

TEKEN EN ONDERSOEK

1. (a) Teken nog twee rangskikkings van swart en grys vierkante om 'n patroon te maak.



- (b) Is daar 'n konstante in jou patroon? Indien wel, wat is die waarde daarvan?

.....

- (c) Is daar 'n veranderlike in jou patroon? Indien wel, wat is die waardes daarvan?

.....

2. (a) Maak nog drie rangskikkings met kolletjies om die ry 1; 3; 6; 10; 15; ... te vorm.



- (b) Hoeveel kolletjies sal daar in die sesde en sewende rangskikking wees? Verduidelik.

.....

.....

.....

- (c) Hoeveel kolletjies is daar altesaam in rangskikking 1 en 2?

- (d) Hoeveel kolletjies is daar altesaam in rangskikking 2 en 3?


- (e) Hoeveel kolletjies is daar altesaam in rangskikking 3 en 4?

- (f) Hoeveel kolletjies is daar altesaam in rangskikking 4 en 5?

(g) Beskryf die patroon in jou antwoorde vir (c), (d), (e) en (f).

.....

3. (a) Teken nog twee rangskikkings om 'n patroon te maak.



(b) Wat is die veranderlikes in jou patroon?

.....

(c) Die getal swart vierkante is 'n veranderlike in hierdie rangskikkings. Die waarde van hierdie veranderlike is 4 in die eerste rangskikking en 8 in die tweede rangskikking. Wat is die waarde van hierdie veranderlike in die derde rangskikking?


(d) Wat is die waardes van elkeen van die veranderlikes in die vyfde rangskikking in jou patroon? Verduidelik jou antwoorde.

.....

.....

.....

4. (a) Maak nou 'n patroon van jou eie.



(b) Gebruik die tabel om die veranderlikes in jou patroon en hul waardes aan te dui.

Rangskikkingnommer	1	2	3	4	5	6

6.3 Verskillende soorte patrone in getallerye

DOEN DIESELFDE DING HERHAALDELIK

1. (a) Skryf die volgende drie getalle in die rye neer.

Ry A: 5 9 13 17 21

Ry B: 5 10 20 40 80

Ry C: 5 10 17 26 37

- (b) Beskryf die verskille in die maniere waarop die drie rye gevorm word.

.....
.....
.....

2. Jy gaan nou 'n ry vorm met die eerste term 5. Skryf 5 aan die linkerkant op die stippellyn hier onder. Tel dan 8 by die eerste term (5) om die tweede term van jou ry te vorm. Skryf die tweede term langs die eerste term (5) neer. Tel nou 8 by die tweede term om die derde term te vorm. Gaan so voort om nog tien terme by te voeg.

Die getalle in 'n ry word ook die **terme** van die ry genoem.

.....

'n Ry kan gevorm word deur herhaaldelik dieselfde getal by te tel of af te trek. In hierdie geval is die **verskil** tussen opeenvolgende terme in 'n ry **konstant**.

Om nog terme van ry A in vraag 1(a) neer te skryf, het jy **herhaaldelik 4 bygetel**.

'n Ry kan ook gevorm word deur herhaaldelik te vermenigvuldig of te deel. In hierdie geval is die **verhouding** tussen opeenvolgende terme **konstant**.

Om nog terme van ry B in vraag 1(a) neer te skryf, het jy **herhaaldelik met 2 vermenigvuldig**.

'n Ry kan ook gevorm word op so 'n manier dat nóg die verskil nóg die verhouding tussen opeenvolgende terme konstant is.

Om nog terme van ry C in vraag 1(a) neer te skryf, het jy nie elke keer dieselfde getal bygetel of met dieselfde getal vermenigvuldig nie.

3. Skryf die volgende drie terme van elke ry neer. Beskryf in elke geval ook wat die patroon is, byvoorbeeld “daar is ’n konstante verskil van -5 tussen opeenvolgende terme”.

(a) 100; 92; 84; 76;

.....

.....

(b) 1; 4; 9; 16;

.....

.....

(c) 2; 8; 18; 32;

.....

.....

(d) 3; 6; 11; 18;

.....

.....

(e) 640; 320; 160;

.....

.....

(f) 1; 2; 4; 7; 11;

.....

.....

4. Volg elke keer die instruksie om ’n ry met agt terme te vorm.

(a) Begin met 1 en vermenigvuldig herhaaldelik met 2.

.....

(b) Begin met 256 en trek herhaaldelik 32 af.

.....

(c) Begin met 256 en deel herhaaldelik deur 2.

.....

Die ry wat jy in vraag 2 gevorm het, kan met 'n tabel soos hierdie getoon word:

Termnommer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Termwaarde	5	13	21	29	37	45	53	61	69	77

5. Vorm 'n ry deur die instruksie te volg. Skryf die termnommers en die termwaardes in die gegewe tabel.

(a) Term 1 = 10. Tel herhaaldelik 15 by.

Termnommer									
Termwaarde									

(b) Term 1 = 10. Termwaarde = $15 \times \text{termnommer} - 5$.

Termnommer									
Termwaarde									

(c) Term 1 = 10. Vermenigvuldig herhaaldelik met 2.

Termnommer							
Termwaarde							

(d) Term 1 = 20. Termwaarde = $10 \times 2^{\text{termnommer}}$

Termnommer						
Termwaarde						

(e) Term 1 = 10. Termwaarde = $10 \times 2^{\text{termnommer} - 1}$

Termnommer						
Termwaarde						

(f) **Term 4** = 30. Tel herhaaldelik 5 by.

Termnommer							
Termwaarde							

6. Instruksies om 'n getallery te vorm is op twee verskillende maniere gegee in vraag 5. Hoe sal jy die twee verskillende maniere beskryf om instruksies te gee om 'n getallery te vorm?

.....

6.4 Formules vir getallerye

Die formule vir 'n getallerye kan op twee verskillende maniere geskryf word:

- 'n Beskrywing van die **verband tussen opeenvolgende terme**. Met ander woorde, die berekening wat jy met 'n term doen om die volgende term te verkry, soos in vraag 5(a), (c) en (f) op die vorige bladsy. Die eerste (of 'n ander) term moet gegee word. Hierdie soort formule het twee dele, die eerste term en die verband tussen terme.
- 'n Beskrywing van die **verband tussen die waarde van die term en sy posisie in die ry**. Hierdie verband beskryf die berekening wat **met die termnommer** gedoen kan word om die **termwaarde** te verkry, soos in vraag 5(b), (d) en (e) op die vorige bladsy.

SKRYF TWEE FORMULES VIR DIESELFDE RY

1. Kies enige heelgetal kleiner as 10 as die eerste term van 'n ry.

- (a) Gebruik die eerste term wat jy gekies het en vorm 'n ry deur herhaaldelik 5 by te tel.

.....

- (b) Vermenigvuldig elke termnommer hier onder met 5 om 'n ry te vorm.

Termnommer	1	2	3	4	5	6	7	8
Termwaarde								

- (c) Wat is eenders aan die twee rye wat jy gevorm het?

.....

- (d) Vul nou jou eie ry in dieselfde tabel in:

Termnommer	1	2	3	4	5	6	7	8
Termwaarde in (b)								
Termwaarde van jou eie ry in (a)								

(e) Wat moet jy by elke termwaarde in (b) bytel of daarvan aftrek om dieselfde ry te verkry as die een wat jy in (a) gemaak het?

.....

(f) Vul die volgende in om 'n formule vir elke ry neer te skryf:

Vir ry in (b): Termwaarde = (termnommer)

Vir die ry in (a): Termwaarde = (termnommer)

2. Jy gaan nou herhaal wat jy in vraag 1 gedoen het, maar met 'n ander stel rye. In hierdie ry word die termnommer met 3 vermenigvuldig om die termwaarde te verkry:

Termnommer	1	2	3	4	5	6	7	8
Termwaarde	3	6	9	12	15	18	21	24

Bepaal nou 'n formule om die verband tussen die **termwaarde** en die **termnommer** vir elkeen van hierdie rye te beskryf:

(a) Die ry wat begin met 8 en gevorm word deur herhaaldelik 3 by te tel

.....

.....

(b) Die ry wat begin met 12 en gevorm word deur herhaaldelik 3 by te tel

.....

.....

(c) Die ry wat begin met 2 en gevorm word deur herhaaldelik 3 by te tel

.....

.....

3. Skryf die eerste agt terme van die volgende rye neer en beskryf hoe elke term uit die vorige term bereken kan word.

(a) Termwaarde = $10 \times \text{termnommer} + 5$

Termnommer	1	2	3	4	5	6	7	8
Termwaarde								

.....

(b) Termwaarde = $5 \times \text{termnommer} - 3$

Termnommer	1	2	3	4	5	6	7	8
Termwaarde								

.....

4. Skryf vir elke ry 'n formule neer om elke term uit die vorige term te verkry en probeer ook 'n formule skryf wat elke term koppel aan sy posisie in die ry. Kontroleer elke formule deur dit toe te pas en skryf die resultate in die gegewe tabel.

(a) 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43

A. Verband tussen opeenvolgende terme:

.....

B. Verband tussen die termwaarde en die term se posisie in die ry:

.....

Termnommer	1	2	3	4	5
Termwaarde deur A te gebruik					
Termwaarde deur B te gebruik					

(b) 60 57 54 51 48 45 42 39 36

A. Verband tussen opeenvolgende terme:

.....

B. Verband tussen termwaarde en sy posisie in ry:

.....

Termnommer	1	2	3	4	5
Termwaarde deur A te gebruik					
Termwaarde deur B te gebruik					

(c) 1 2 4 8 16 32 64 128

A. Verband tussen opeenvolgende terme:

.....

B. Verband tussen termwaarde en sy posisie in ry:

.....

Termnommer	1	2	3	4	5
Termwaarde deur A te gebruik					
Termwaarde deur B te gebruik					

HOOFSTUK 7

Funksies en verbande

In hierdie hoofstuk gaan jy met verbande werk tussen versamelings getalle wat invoergetalle en uitvoergetalle genoem word. Jy gaan die uitvoergetalle bepaal wat met gegewe invoergetalle ooreenstem, en andersom. Jy gaan reëls gebruik om die uitvoergetalle te bereken, en jy gaan vergelykings oplos om die invoergetalle te bepaal. Die reëls om die uitvoergetalle te bereken kan in woorde, as vloedigramme of as formules gegee word.

7.1	Bepaal uitvoergetalle vir gegewe invoergetalle	101
7.2	Verskillende maniere om dieselfde verband voor te stel	103
7.3	Verskillende voorstellings van dieselfde verband	107

-10	100	-19	-36	-51	-64	-75	-84	-91
-9	81	-17	-32	-45	-56	-65	-72	-77
-8	64	-15	-28	-39	-48	-55	-60	-63
-7	49	-13	-24	-33	-40	-45	-48	-49
-6	36	-11	-20	-27	-32	-35	-36	-35
-5	25	-9	-16	-21	-24	-25	-24	-21
-4	16	-7	-12	-15	-16	-15	-12	-7
-3	9	-5	-8	-9	-8	-5	0	7
-2	4	-3	-4	-3	0	5	12	21
-1	1	-1	0	3	8	15	24	35
0	0	1	4	9	16	25	36	49
1	1	3	8	15	24	35	48	63
2	4	5	12	21	32	45	60	77
3	9	7	16	27	40	55	72	91
4	16	9	20	33	48	65	84	105
5	25	11	24	39	56	75	96	119
6	36	13	28	45	64	85	108	133
7	49	15	32	51	72	95	120	147
8	64	17	36	57	80	105	132	161
9	81	19	40	63	88	115	144	175
10	100	21	44	69	96	125	156	189

7 Funksies en verbande

7.1 Bepaal uitvoergetalle vir gegewe invoergetalle

TWEE VERSKILLENDE VERSAMELINGS INVOERGETALLE

In hierdie aktiwiteit gaan jy berekeninge doen met:

Versameling A: die natuurlike getalle kleiner as 10, dit wil sê die getalle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.

Versameling B: veelvoude van 10 wat groter is as 10 maar kleiner as 100, dit wil sê die getalle 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 en 90.

1. Jy gaan 'n getal kies, dit met 5 vermenigvuldig en dan die antwoord van 50 aftrek.

(a) Kies enige getal uit versameling A en doen die berekeninge hier bo.

.....

(b) Kies enige getal uit versameling B en doen die berekeninge hier bo.

.....

(c) As jy enige ander getal uit versameling B kies, dink jy die antwoord sal ook 'n negatiewe getal wees?

.....

.....

2. (a) Skryf al die verskillende uitvoergetalle neer wat verkry sal word as die stel berekeninge $50 - 5x$ op die verskillende getalle in versameling A uitgevoer word.

.....

.....

(b) Skryf die uitvoergetalle neer wat verkry sal word wanneer die stel berekeninge $50 - 5x$ op versameling B toegepas word.

.....

.....

Uitvoergetalle is getalle wat jy kry wanneer jy die reël op die invoergetalle toepas.

3. (a) Voltooi die volgende tabel vir versameling A:

Invoergetalle	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Waardes van $50 - 5x$									

(b) Voltooi die volgende tabel vir versameling B:

Invoergetalle	20	30	40	50	60	70	80	90
Waardes van $50 - 5x$								

4. In hierdie vraag is jou versameling invoergetalle die ewe getalle 2; 4; 6; 8; 10; ...

(a) Wat sal al die uitvoergetalle wees as die rekenvoorskrif $2n + 1$ op die versameling ewe getalle toegepas word? Maak 'n lys.

.....

(b) Wat sal die uitvoergetalle wees as die rekenvoorskrif $2n - 1$ toegepas word?

.....
 (c) Wat sal die uitvoergetalle wees as die rekenvoorskrif $2n + 5$ toegepas word?

.....
 (d) Wat sal die uitvoergetalle wees as die rekenvoorskrif $3n + 1$ toegepas word?

.....

5. (a) Watter soort uitvoergetalle sal verkry word as die rekenvoorskrif $x - 1\ 000$ op natuurlike getalle kleiner as 1 000 toegepas word?

.....

(b) Watter soort uitvoergetalle sal verkry word as die rekenvoorskrif $\frac{x}{10} + 10$ op natuurlike getalle kleiner as 10 toegepas word?

.....

(c) As jy die reël $30x + 2$ gebruik en invoergetalle gebruik wat positiewe breuke met noemers 2, 3 en 5 is, watter soort uitvoergetalle sal jy kry?

.....

.....

7.2 Verskillende maniere om dieselfde verband voor te stel

Dink terug aan die werk wat jy in afdeling 6.4 van hoofstuk 6 gedoen het. Daar was twee veranderlike hoeveelhede in elke vraag.

As een veranderlike hoeveelheid deur 'n ander een beïnvloed word, sê ons daar is 'n **verband** tussen die twee veranderlikes. Jy kan soms uitwerk watter getal aan 'n spesifieke waarde van die ander veranderlike gekoppel is.

'n Algebraïese uitdrukking soos $10x + 5$ beskryf watter berekeninge gedoen moet word om die uitvoergetal te bepaal wat met 'n gegewe invoergetal ooreenstem.

Toepassing van die rekenvoorskrif $10x + 5$ gee net een uitvoergetal vir enige invoergetal en dit is baie duidelik wat daardie getal is. As die rekenvoorskrif byvoorbeeld op $x = 3$ toegepas word, is die uitvoergetal 35.

'n Verband tussen twee veranderlikes waarin daar net een uitvoergetal vir elke invoergetal is, word 'n **funksie** genoem.

Funksies kan op verskillende maniere voorgestel word:


- Met 'n tabel wat die waardes van die twee veranderlikes wys. 'n Tabel wys duidelik watter waarde van die uitvoerveranderlike ooreenstem met elke bepaalde waarde van die invoerveranderlike.
- Met 'n vloeiagram, wat wys watter berekeninge gedoen moet word om die uitvoergetal te bereken wat met 'n gegewe invoergetal ooreenstem.
- Met 'n formule, wat ook beskryf watter berekeninge gedoen moet word om die uitvoergetal te bereken wat met 'n gegewe invoergetal ooreenstem.
- Met 'n grafiek.

Voorbeelde van hierdie vier maniere om 'n funksie te beskryf word op die volgende bladsye gegee.

'n Hoeveelheid wat verander word 'n **veranderlike hoeveelheid** of net 'n **veranderlike** genoem.

Die uitvoergetal kan ook die **uitvoerwaarde**, of die **waarde van die uitdrukking**, wat $10x + 5$ in hierdie geval is, genoem word.

1. Voltooi die vloeiagram:



'n Voltooide vloeiagram wys twee soorte inligting:

- Dit wys watter berekeninge gedoen word om die uitvoergetalle te lewer.
- Dit wys watter uitvoergetal aan watter invoergetal gekoppel is.

Die vloeiagram wat jy voltooi het wys die volgende inligting:

- Dit wys dat elke invoergetal met 5 vermenigvuldig word en dan word 20 bygetel om die uitvoergetalle te lewer.
- Dit wys watter uitvoergetalle met watter invoergetalle ooreenstem.

Die berekeninge wat gedoen moet word kan ook met 'n uitdrukking beskryf word. Die uitdrukking $5x + 20$ beskryf watter berekeninge jy in vraag 1 gedoen het. Jy kan dit ook as 'n formule skryf:

- 'n Woordformule:
uitvoergetal = $5 \times$ invoergetal + 20
- 'n Algebraïese formule:
uitvoergetal = $5x + 20$

Die uitvoergetalle van 'n funksie word ook **funksiewaardes** genoem. Die formule kan dus ook geskryf word as
funksiewaarde = $5x + 20$

2. Voltooi hierdie tabel vir die funksie wat deur $5x + 20$ beskryf word.


Invoergetalle	-1	-2	-3	-4	-5
Funksiewaardes					

3. Teken 'n grafiek van hierdie funksie op die volgende bladsy.



4. 'n Grafiek van 'n bepaalde funksie word hier onder gegee. Voltooi die tabel vir hierdie funksie.

Invoergetalle					
Funksiewaardes					



7.3 Verskillende voorstellings van dieselfde verband


Doen hierdie werk op die volgende bladsye. Daar is 'n bladsy vir elke vraag.


Stel elk van die volgende funksies voor met

- (a) 'n vloeiagram
- (b) 'n tabel van waardes vir die versameling heelgetalle van -5 tot 5
- (c) 'n grafiek.


1. Die verband wat beskryf word deur die uitdrukking $3x + 4$
2. Die verband wat beskryf word deur die uitdrukking $2x - 5$
3. Die verband wat beskryf word deur die uitdrukking $\frac{1}{2}x + 2$
4. Die verband wat beskryf word deur die uitdrukking $-3x + 4$
5. Die verband wat beskryf word deur die uitdrukking $2,5x + 1,5$
6. Die verband wat beskryf word deur die uitdrukking $0,2x + 1,4$
7. Die verband wat beskryf word deur die uitdrukking $-2x - 4$

1.







2.







3.







4.







5.







6.





7.





HOOFSTUK 8

Algebraïese uitdrukkings

'n Algebraïese uitdrukking is 'n beskrywing van 'n stel bewerkings wat in 'n bepaalde volgorde gedoen moet word. In hierdie hoofstuk gaan jy leer om 'n ander stel bewerkings te spesifiseer wat dieselfde resultate as 'n gegewe stel bewerkings sal lewer. Twee verskillende uitdrukkings wat dieselfde resultate lewer word ekwivalente uitdrukkings genoem.

8.1	Algebraïese taal.....	117
8.2	Eienskappe van bewerkings.....	124
8.3	Kombineer gelyksoortige terme in algebraïese uitdrukkings.....	127
8.4	Vermenigvuldiging van algebraïese uitdrukkings.....	131
8.5	Deel veelterme deur heelgetalle en eenterme.....	135
8.6	Produkte en kwadrate van tweeterme.....	139
8.7	Vervanging in algebraïese uitdrukkings.....	142



8 Algebraïese uitdrukkings

8.1 Algebraïese taal

WOORDE, DIAGRAMME EN UITDRUKKINGS

1. Voltooi hierdie tabel.

	Woorde	Vloedidiagram	Uitdrukking
	Vermenigvuldig 'n getal met 5 en trek dan 3 van die antwoord af.	$\text{---} \boxed{\times 5} \text{---} \boxed{- 3} \text{---} \rightarrow$	$5x - 3$
(a)	Tel 5 by 'n getal en vermenigvuldig die antwoord met 3.	$\text{---} \boxed{} \text{---} \boxed{} \text{---} \rightarrow$	
(b)		$\text{---} \boxed{- 3} \text{---} \boxed{\times 5} \text{---} \rightarrow$	
(c)			$3(2x + 3)$

'n **Algebraïese uitdrukking** dui 'n **opeenvolging van bewerkings** aan wat ook in woorde en, in sommige gevalle, met vloediagramme beskryf kan word.

Uitdrukkings in hakies moet altyd eerste bereken word. As daar nie hakies in 'n algebraïese uitdrukking is nie, beteken dit dat vermenigvuldiging en deling eerste gedoen moet word, en optelling en aftrekking daarna.

Byvoorbeeld, as $x = 5$ beteken die uitdrukking $12 + 3x$ "vermenigvuldig 5 met 3 en tel dan 12 by". Dit beteken *nie* "tel 12 en 3 bymekaar en vermenigvuldig dan met 5" nie.

As jy wil sê "tel 12 en 3 bymekaar en vermenigvuldig dan met 5", moet die numeriese uitdrukking $5 \times (12 + 3)$ of $(12 + 3) \times 5$ wees.

2. Beskryf elk van hierdie reekse berekeninge met 'n algebraïese uitdrukking:

(a) Vermenigvuldig 'n getal met 10, trek 5 van die antwoord af en vermenigvuldig die antwoord met 3.

.....

(b) Trek 5 van 'n getal af, vermenigvuldig die antwoord met 10 en vermenigvuldig hierdie antwoord met 3.

.....

3. Evalueer elkeen van hierdie uitdrukkings vir $x = 10$:

(a) $200 - 5x$

(b) $(200 - 5)x$

.....

(c) $5x + 40$

(d) $5(x + 40)$

.....

(e) $40 + 5x$

(f) $5x + 5 \times 40$

.....

'N PAAR WOORDE WAT ONS IN ALGEBRA GEBRUIK

'n Uitdrukking met net een term, soos $3x^2$, word 'n **eenterm** genoem. 'n Uitdrukking wat 'n som van twee terme is, soos $5x + 4$, word 'n **tweeterm** genoem. 'n Uitdrukking wat 'n som van drie terme is, soos $3x^3 + 2x + 9$, word 'n **drieterm** genoem.

Die simbool x word dikwels gebruik om die **veranderlike** in 'n algebraïese uitdrukking voor te stel, maar ander lettersimbole kan ook gebruik word. In die eenterm $3x^2$, word die 3 die **koëffisiënt** van x^2 genoem. In die tweeterm $5x + 4$ en in die drieterm $3x^2 + 2x + 9$ word die getalle 4 en 9 **konstantes** genoem.

1. Gebruik die voltooide eerste ry as 'n voorbeeld en voltooi die tabel.

Uitdrukking	Soort uitdrukking	Simbool wat die veranderlike voorstel	Konstante	Koëffisiënt van
$x^2 + 6x + 10$	Drieterm	x	10	die tweede term is 6
$6s^3 + s^2 + 5$				s^2 is
$\frac{k}{3} + 12$				die eerste term is
$4p^{10}$				p^{10} is

2. Kyk na die patroon-veelterm wat met $7x^5 + 5x^4 + 3x^3 + x^2 + \dots$ begin.

(a) Wat is die koëffisiënt van die vierde term?

(b) Wat is die eksponentwaarde van die vyfde term?

(c) Dink jy die sesde term sal 'n konstante wees? Waarom?

.....

EKWIVALENTE ALGEBRAÏESE UITDRUKKINGS

1. Bereken die numeriese waarde van die uitdrukkings vir die verskillende waardes van x . Doen die berekeninge in jou oefeningboek. Vul dan jou antwoorde in.

	x	-2	-1	0	1	2
(a)	$3x + 2$					
(b)	$2x - 3$					
(c)	$3x + 2 + 2x - 3$					
(d)	$2x - 3 + 3x + 2$					
(e)	$5x - 1$					
(f)	$(3x + 2)(2x - 3)$					
(g)	$3x(2x - 3) + 2(2x - 3)$					
(h)	$6x^2 - 5x - 6$					
(i)	$\frac{(3x+2)(2x-3)}{3x+2}$					
(j)	$\frac{6x^2 - 5x - 6}{3x+2}$					

2. Maak 'n lys van al die algebraïese uitdrukkings hier bo wat dieselfde numeriese waarde vir dieselfde waarde van x het, al lyk hulle verskillend:

.....

Ekwivalente uitdrukkings is algebraïese uitdrukkings wat uit verskillende stelle van bewerkings bestaan, maar dieselfde numeriese waarde vir enige gegewe waarde van x het.

Dit is dikwels gerieflik om nie met 'n gegewe uitdrukking te werk nie, maar dit met 'n ekwivalente uitdrukking te **vervang**.

3. Voltooi hierdie tabel.

x	2	3	5	10	-5	-10
$12x - 7 + 3x + 10 - 5x$						

4. Voltooi hierdie tabel.

x	2	3	5	10	-5	-10
$10x + 3$						

5. (a) Is $10x + 3$ ekwivalent aan $12x - 7 + 3x + 10 - 5x$? Verduidelik jou antwoord.

.....

(b) Gestel jy moet weet hoeveel $12x - 7 + 3x + 10 - 5x$ vir $x = 37$ en $x = -43$ is.

Wat dink jy is die maklikste manier om dit uit te vind?

KONVENSIES OM ALGEBRAÏESE UITDRUKKINGS TE SKRYF

Hier is 'n paar dinge waarvoor wiskundiges ooreengekom het. Dit maak wiskundige werk baie makliker as almal by hierdie ooreenkomste hou.

'n **Konvensie** is iets waarvoor mense ooreengekom het om op dieselfde manier te doen.

Die vermenigvuldigteken word dikwels in algebraïese uitdrukking weggelaat. Ons skryf gewoonlik $4x$ in plaas van $4 \times x$ en $4(x - 5)$ in plaas van $4 \times (x - 5)$.

'n Verdere konvensie is om 'n bekende getal eerste te skryf in 'n produk, dit wil sê ons skryf $3 \times x$ in plaas van $x \times 3$, en ons skryf $3x$ **maar nie** x^3 nie.

1. Skryf elk van die volgende oor op die manier waarop dit gewoonlik in algebraïese uitdrukking geskryf word.

(a) $x \times 4 + x \times y - y \times 3$

(b) $7 \times (10 - x) + (5 \times x + 3)10$

.....

Mense oral in die wêreld het ooreengekom dat, in uitdrukkings wat nie hakies bevat nie, optel en aftrek gedoen moet word soos dit van links na regs in die uitdrukking voorkom.

Volgens hierdie konvensie beteken $x - y + z$ dat jy eers y van x moet aftrek en dan z moet bytel. Byvoorbeeld, as $x = 10$, $y = 5$ en $z = 3$, is $x - y + z$ dus $10 - 5 + 3$ en dit beteken $10 - 5 = 5$, dan $5 + 3 = 8$. Dit beteken nie $5 + 3 = 8$, dan $10 - 8 = 2$ nie.

2. Bereken $50 - 20 + 30$ en $50 + 30 - 20$ en $50 - 30 + 20$.

.....

3. Evalueer elk van die volgende uitdrukkings vir $x = 10$, $y = 5$ en $z = 2$.

(a) $x + y - z$

(b) $x - z + y$

.....

(c) $10y - 3x + 5z - 4y$

(d) $10y - 3x - 5z + 4y + 3x$

.....

Mense het ook ooreengekom dat **vermenigvuldiging** (en deling) **voor optel en aftrek** gedoen moet word in uitdrukkings wat nie hakies bevat nie.

Dus moet $5 + 3 \times 4$ verstaan word as “vermenigvuldig 4 met 3 en tel dan die antwoord by 5” en nie as “tel 5 en 3 bymekaar en vermenigvuldig dan die antwoord met 4” nie.

Dus moet $3 \times 4 + 5$ ook verstaan word as “vermenigvuldig 4 met 3 en tel dan 5 by die antwoord” en nie as “tel 4 en 5 bymekaar en vermenigvuldig dan die antwoord met 3” nie.

4. Doen elk van die volgende berekeninge:

(a) vermenigvuldig 4 met 3 en tel dan 5 by die antwoord

.....

(b) tel 4 en 5 bymekaar en vermenigvuldig die antwoord met 3

.....

(c) vermenigvuldig 4 met 3 en tel dan die antwoord by 5

.....

(d) tel 5 en 3 bymekaar en vermenigvuldig dan die antwoord met 4

.....

5. Herskryf die instruksies in 4(a) en 4(c) sonder om woorde te gebruik.

.....
.....

6. Bereken elk van die volgende.

(a) $10 \times 5 + 30$

(b) $30 + 10 \times 5$

.....
(c) $10 \times 5 - 30$

.....
(d) $30 - 10 \times 5$

.....

7. (a) Tel 4 en 5 bymekaar en trek dan die antwoord van 20 af.

.....

(b) Trek 4 van 20 af en tel dan 5 by.

.....

(c) Tel 4 en 5 bymekaar en vermenigvuldig dan die antwoord met 3.

.....

(d) Vermenigvuldig 3 met 5 en tel dan die antwoord by 4.

.....

As ons die berekeninge in 7(a) en 7(c) wil spesifiseer sonder om woorde te gebruik, het ons 'n paar uitdagings.

Ons kan nie $20 - 4 + 5$ vir “tel 4 en 5 bymekaar en trek dan die antwoord van 20 af” skryf nie, want dit sal “trek 4 van 20 af en tel dan 5 by” beteken. Ons het 'n manier nodig, sonder om woorde te gebruik, om in hierdie geval aan te dui dat ons eers wil optel en daarna wil aftrek.

Net so kan ons nie $4 + 5 \times 3$ vir “tel 4 en 5 bymekaar en vermenigvuldig die antwoord met 3” skryf nie, want dit sal “vermenigvuldig 3 met 5 en tel dan die antwoord by 4” beteken. Ons het 'n manier nodig, sonder om woorde te gebruik, om in hierdie geval aan te dui dat ons wil hê die optelling moet voor die vermenigvuldiging gedoen word.

Wiskundiges het ooreengekom om hakies te gebruik om die uitdagings hier bo aan te spreek. Die volgende konvensie word oral in die wêreld gebruik:

Elke keer as daar hakies in 'n uitdrukking is, moet die berekeninge tussen hakies eerste gedoen word.

Dus beteken $20 - (4 + 5)$ tel 4 en 5 bymekaar en trek dan die antwoord van 20 af, maar $20 - 4 + 5$ beteken trek 4 van 20 af en tel dan 5 by.

$(4 + 5) \times 3$ of $3 \times (4 + 5)$ beteken *tel 4 en 5 bymekaar en vermenigvuldig dan die antwoord met 3*, maar $4 + 5 \times 3$ beteken *vermenigvuldig 3 met 5 en tel dan die antwoord by 4*.

$10 + 2(5 + 9)$ beteken *tel 5 en 9 bymekaar, vermenigvuldig die antwoord met 2 en tel dan hierdie antwoord by 10*: $5 + 9 = 14$ $14 \times 2 = 28$ $28 + 10 = 38$

8. Bereken elk van die volgende.

(a) $100 + 50 - 30$

(b) $100 + (50 - 30)$

.....

.....

(c) $100 - 50 + 30$

(d) $100 - (50 + 30)$

.....

.....

(e) $3(10 - 4) + 2$

(f) $10(5 + 7) + 3(18 - 8)$

.....

.....

(g) $250 - 10 \times (18 + 2) + 35$

(h) $(20 + 20) \times (20 - 10)$

.....

.....

(i) $(250 - 10) \times (18 + 2) + 35$

(j) $20 + 20 \times (20 - 10)$

.....

.....

(k) $200 + (100 \times 2(15 + 5))$

(l) $(200 + 100) \times 2 \times 15 + 5$

.....

.....

In algebra skryf ons gewoonlik $3(x + 2y)$ in plaas van $(x + 2y) \times 3$, en ons skryf $3(x - 2y)$ in plaas van $(x - 2y) \times 3$. Jy moenie toelaat dat hierdie konvensionele manier van skryf in algebra jou verwar nie. Die uitdrukking $3(x + 2y)$ beteken nie dat vermenigvuldiging met 3 die eerste ding is wat jy moet doen wanneer jy die uitdrukking vir sekere waardes van x en y evalueer nie. Die eerste ding wat jy moet doen, is om die waardes van x en y bymekaar te tel. Dit is wat die hakies vir jou sê!

Om die instruksies $3(x + 2y)$ uit te voer is egter nie die enigste manier waarop jy kan uitvind hoeveel $3(x + 2y)$ vir enige gegewe waardes van x en y is nie. In plaas daarvan om $3(x + 2y)$ uit te werk, kan jy $3x + 6y$ uitwerk. In hierdie geval sal jy elke term vermenigvuldig voordat jy hulle bymekaartel.

9. Evalueer elk van die volgende uitdrukkings vir $x = 10$, $y = 5$ en $z = 2$.

(a) $xy + z$

(b) $x(y + z)$

.....

.....

(c) $x + yz$

(d) $xy + xz$

.....

.....

(e) $xy - z$

(f) $x(y - z)$

.....

.....

(g) $x - yz$

(h) $xy - yz$

.....

.....

(i) $x + (y - z)$

(j) $x - (y - z)$

.....

.....

(k) $x - (y + z)$

(l) $x - y - z$

.....

.....

(m) $x + y - z$

(n) $x - y + z$

.....

.....

8.2 Eienskappe van bewerkings

1. Bereken die volgende:

(a) $5(3 + 4)$

(b) $5 \times 3 + 5 \times 4$

.....

.....

(c) $6 \times 3 + (4 + 6)$

(d) $(6 + 4) + 3 \times 6$

.....

.....

(e) $3 \times (4 \times 5)$

(f) $(3 \times 4) \times 5$

.....

.....

Jy moes raakgesien het dat die resultate in elke ry dieselfde is. Dit is omdat bewerkings met getalle sekere eienskappe het, naamlik die **verspreidingseienskap** (of **distributiewe eienskap**), die **omruilingseienskap** (of **kommutatiewe eienskap**) en die **groeperingseienskap** (of **assosiatiewe eienskap**).

Die **verspreidingseienskap** (of distributiewe eienskap) word gebruik elke keer wat jy 'n getal in dele vermenigvuldig, byvoorbeeld:

Die getal vier-en-dertig is eintlik $30 + 4$. Jy kan 5×34 bereken deur 5×30 en 5×4 te bereken en dan die twee antwoorde bymekaar te tel:

$$5 \times 34 = 5 \times 30 + 5 \times 4$$

Die woord "distribueer" beteken om te **versprei**. Die verspreidingseienskap kan soos volg beskryf word:
 $a(b + c) = ab + ac$
 waar a , b en c enige getalle kan wees.
 Ons kan sê: "vermenigvuldiging versprei oor optel".

2. Bereken elk van die volgende:

(a) $5(x - y)$ vir $x = 10$ en $y = 8$

(b) $5x - 5y$ vir $x = 10$ en $y = 8$

.....

.....

(c) $5(x - y)$ vir $x = 100$ en $y = 30$

(d) $5x - 5y$ vir $x = 100$ en $y = 30$

.....

.....

(e) $5(x - y + z)$ vir $x = 10$, $y = 3$, $z = 2$

(f) $5x - 5y + 5z$ vir $x = 10$, $y = 3$, $z = 2$

.....

.....

3. Ons sê "vermenigvuldiging versprei oor optel".

Versprei vermenigvuldiging oor aftrek ook?

Gee voorbeelde om jou antwoord te staaf.

.....

Vir enige waardes van x en y ,

- gee $x + y$ en $y + x$ dieselfde antwoorde, en
- gee xy en yx dieselfde antwoorde.

Dit word die **omruilingseienskap** (of **kommutatiewe eienskap**) van optel en vermenigvuldiging genoem.

4. Ons sê "optel is kommutatief" en "vermenigvuldiging is kommutatief".

Is aftrek ook kommutatief? Staaf jou antwoord met 'n voorbeeld.

.....

Die **groeperingseienskap** (of **assosiatiewe eienskap**) stel jou in staat om drie of meer getalle in enige volgorde te rangskik wanneer jy optel of vermenigvuldig. Vir enige waardes van x , y en z het die volgende uitdrukkings almal dieselfde antwoord:

$$x + y + z \qquad y + x + z \qquad z + y + x$$

5. Bereken $16 + 33 + 14 + 17$ op die maklikste moontlike manier.

.....

Die groeperingseienskap van vermenigvuldiging stel jou in staat om iets soos die volgende te vereenvoudig.

$$abc + bca + cba$$

Omdat die volgorde van vermenigvuldiging nie die resultaat verander nie, kan ons hierdie uitdrukking herskryf as: $abc + abc + abc$. Ons kan dit vereenvoudig deur gelyksoortige terme te kombineer om $3abc$ te kry.

Jy sal hierdie eienskappe dwarsdeur hierdie hoofstuk kan gebruik en wanneer jy algebraïese manipulasies doen.

Wanneer jy 'n uitdrukking vorm om ekwivalent te wees aan 'n gegewe uitdrukking sê ons dat jy die uitdrukking *manipuleer*.

6. Vervang elk van die volgende uitdrukkings met 'n eenvoudiger uitdrukking wat dieselfde antwoord sal gee. **Moenie nou enige berekeninge doen nie**. Sê net elke keer hoe jou vervanging dit makliker maak.

(a) $17 \times 43 + 17 \times 57$

.....

(b) $7 \times 5 \times 8 \times 4 + 12 \times 8 \times 4 \times 7 - 9 \times 4 \times 5 \times 8$

.....

(c) $43 \times 17 + 57 \times 17$

(d) $43x + 57x$ (vir $x = 213$ of enige ander waarde)

.....

7. Watter eienskappe van bewerkings het jy in elke deel van vraag 6 gebruik?

.....

8.3 Kombineer gelyksoortige terme in algebraïese uitdrukkings

HERRANGSKIK TERME EN KOMBINEER DAN GELYKSOORTIGE TERME

Om te kontroleer of twee uitdrukkings dalk ekwivalent is, kan jy albei uitdrukkings vir verskeie verskillende waardes van die veranderlike evalueer.

- Voorspel in elke geval hier onder eers of die twee uitdrukkings ekwivalent is en kontroleer dan deur albei uitdrukkings vir $x = 1$, $x = 10$, $x = 2$ en $x = -2$ in die tabelle te evalueer.

(a) $x(x + 3)$ en $x^2 + 3$

.....

(b) $x(x + 3)$ en $x^2 + 3x$

.....

Sommige uitdrukkings kan vereenvoudig word deur die terme te herrangskik en gelyksoortige terme te kombineer. In die uitdrukking $5x^2 + 13x + 7 + 2x^2 - 8x - 12$ is die terme $5x^2$ en $2x^2$ gelyksoortige terme.

■ Twee of meer gelyksoortige terme kan gekombineer word om 'n enkele term te vorm.

$5x^2 + 2x^2$ kan met $7x^2$ vervang word, want vir enige waarde van x , byvoorbeeld $x = 2$ of $x = 10$, sal berekening van $5x^2 + 2x^2$ en $7x^2$ dieselfde uitvoerwaarde gee (probeer dit!).

2. Voltooi die tabel.

x	10	2	5	1
$5x^2 + 2x^2$				
$7x^2$				
$13x - 8x$				
$5x$				

Dit is moeilik om die gelyksoortige terme in 'n lang uitdrukking soos byvoorbeeld $3x^2 + 13x + 7 + 2x^2 - 8x - 12$ raak te sien. Gelukkig kan jy die terme in 'n uitdrukking herrangskik sodat die gelyksoortige terme langs mekaar is.

3. (a) Voltooi die tweede en derde rye van die tabel hier onder. Jy sal die volgende twee rye voltooi wanneer jy vraag (g) doen.

x	10	2	5	1
$3x^2 + 13x + 7 + 2x^2 - 8x - 12$				
$3x^2 + 2x^2 + 13x - 8x + 7 - 12$				

(b) Wat sien jy raak?

(c) Hoe verskil die een uitdrukking in die tabel hier bo van die ander een?

.....
 (d) Kombineer die gelyksoortige terme in $3x^2 + 2x^2 + 13x - 8x + 7 - 12$ om 'n korter ekwivalente uitdrukking te maak.

.....
 (e) Evalueer jou korter uitdrukking vir $x = 10$, $x = 2$ en $x = 5$.

(f) Is jou korter uitdrukking ekwivalent aan $3x^2 + 13x + 7 + 2x^2 - 8x - 12$?
Verduidelik hoe jy weet of dit is, of nie is nie.

.....
.....
.....

(g) Evalueer $5x^2 + 5x - 5$ en $5(x^2 + x - 1)$ vir $x = 10$, $x = 2$, $x = 5$ en $x = 1$, en skryf jou antwoorde in die laaste twee rye van die tabel hier bo.

4. Vereenvoudig elke uitdrukking:

(a) $(3x^2 + 5x + 8) + (5x^2 + x + 4)$

(b) $(7x^2 + 3x + 5) + (2x^2 - x - 2)$

.....

(c) $(6x^2 - 7x - 4) + (4x^2 + 5x + 5)$

(d) $(2x^2 - 5x - 9) - (5x^2 - 2x - 1)$

.....

(e) $(-2x^2 + 5x - 3) + (-3x^2 - 9x + 5)$

(f) $(y^2 + y + 1) + (y^2 - y - 1)$

.....

5. Voltooi die tabel. (Wenk: Maak dit vir jouself makliker deur eers te vereenvoudig!)

.....
.....
.....
.....

x	2,5	3,7	6,4	12,9	35	-4,7	-0,04
$(3x + 6,5) + (7x + 3,5)$							
$(13x - 6) + (26 - 12x)$							

6. Vereenvoudig:

(a) $(2r^2 + 3r - 5) + (7r^2 - 8r - 12)$

(b) $(2r^2 + 3r - 5) - (7r^2 - 8r - 12)$

.....

(c) $(2x + 5xy + 3y) - (12x - 2xy - 5y)$

(d) $(2x + 5xy + 3y) + (12x - 2xy - 5y)$

.....

7. Evalueer die volgende uitdrukkings vir $x = 3$, $x = -2$, $x = 5$ en $x = -3$.

(a) $2x(x^2 - x - 1) + 5x(2x^2 + 3x - 5) - 3x(x^2 + 2x + 1)$

.....

(b) $(3x^2 - 5x + 7) - (7x^2 + 3x - 5) + (5x^2 - 2x + 8)$

.....

8. Skryf ekwivalente uitdrukkings sonder hakies.

(a) $3x^4 - (x^2 + 2x)$

(b) $3x^4 - (x^2 - 2x)$

.....

(c) $3x^4 + (x^2 - 2x)$

(d) $x - (y + z - t)$

.....

9. Skryf ekwivalente uitdrukkings sonder hakies, herrangskik sodat gelyksoortige terme saam gegroeper is, en kombineer dan die gelyksoortige terme.

(a) $2y^2 + (y^2 - 3y)$

(b) $3x^2 + (5x + x^2)$

.....

(c) $6x^2 - (x^4 + 3x^2)$

(d) $2t^2 - (3t^2 - 5t^3)$

.....

(e) $6x^2 + 3x - (4x^2 + 5x)$

(f) $2r^2 - 5r + 7 + (3r^2 - 7r - 8)$

.....

(g) $5(x^2 + x) + 2(x^2 + 3x)$

(h) $2x(x - 3) + 5x(x + 2)$

.....

10. Skryf ekwivalente uitdrukkings sonder hakies en vereenvoudig hierdie uitdrukkings sover as moontlik.

Voorbeeld $5r^2 - 2r(r + 5) = 5r^2 - 2r^2 - 10r$
 $= 3r^2 - 10r$

(a) $3x^2 + x(x + 3)$

(b) $5x + x(7 - 2x)$

.....

(c) $6r^2 - 2r(r - 5)$

(d) $2a(a + 3) + 5a(a - 2)$

.....

(e) $6y(y + 1) - 3y(y + 2)$

(f) $4x(2x - 3) - 3x(x + 2)$

.....
(g) $2x^2(x - 5) - x(3x^2 - 2)$

.....
(h) $x(x - 1) + x(2x + 3) - 2x(3x + 1)$

8.4 Vermenigvuldiging van algebraïese uitdrukkings

VERMENIGVULDIG VEELTERME MET EENTERME

1. (a) Bereken 3×38 en 3×62 en tel die twee antwoorde bymekaar.

.....
.....

- (b) Tel 38 en 62 bymekaar en vermenigvuldig dan die antwoord met 3.

.....

- (c) As jy nie dieselfde antwoord vir (a) en (b) gekry het nie, het jy 'n fout gemaak. Doen dit weer en weer tot jy dit regkry.

Die feit dat jy dieselfde antwoord in vraag 1(a) en 1(b) kry as jy korrek gewerk het, is 'n voorbeeld van die **verspreidingseienskap**.

Die verspreidingseienskap kan soos volg beskryf word:
 $a(b + c) = ab + ac$ en
 $a(b - c) = ab - ac$,
waar a , b en c enige getalle kan wees.

Wat jy in vraag 1 gesien het, was dat
 $3 \times 100 = 3 \times 38 + 3 \times 62$.

Dit kan ook uitgedruk word deur $3(38 + 62) = 3 \times 38 + 3 \times 62$ te skryf.

2. (a) Bereken 10×56

- (b) Bereken $10 \times 16 + 10 \times 40$

3. (a) Skryf enige twee getalle kleiner as 100 neer. Kom ons noem hulle x en y . Tel jou twee getalle bymekaar en vermenigvuldig die antwoord met 3.

.....

- (b) Bereken $3 \times x$ en $3 \times y$ en tel die twee antwoorde bymekaar.

.....

- (c) As jy nie dieselfde antwoord vir (a) en (b) kry nie, het jy iewers 'n fout gemaak. Maak jou werk reg.

4. Voltooi die tabel.

x	12	50	5
y	4	30	10
$5x - 5y$			
$5(x - y)$			
$5x + 5y$			
$5(x + y)$			

Om die rekenvoorskrif $5(x + y)$ uit te voer is nie die enigste manier waarop jy kan uitvind wat die waarde van $5(x + y)$ is vir enige gegewe waardes van x en y nie. Jy kan ook $5x + 5y$ gebruik. In hierdie geval sal jy 5 eers met x maal, en dan met y voor jy optel.

5. (a) Vir $x = 10$ en $y = 20$, evalueer $8(x + y)$ deur eers 10 en 20 bymekaar te tel en dan met 8 te vermenigvuldig.

.....

(b) Evalueer nou $8(x + y)$ deur $8x + 8y$ te bepaal, met ander woorde bereken eers 8×10 en 8×20 .

.....

6. In vraag 5 het jy $8(x + y)$ op twee verskillende maniere geëvalueer vir die gegewe waardes van x en y . Evalueer nou ook $20(x - y)$ op twee verskillende maniere vir $x = 5$ en $y = 3$.

.....

.....

7. Gebruik die verspreidingseienskap in elk van die volgende gevalle om 'n ander uitdrukking te maak wat ekwivalent is aan die gegewe uitdrukking.

(a) $a(b + c)$

(b) $a(b + c + d)$

.....

(c) $x(x + 1)$

.....

(e) $x(x^3 + x^2 + x + 1)$

.....

(f) $x^2(x^2 - x + 3)$

.....

(d) $x(x^2 + x + 1)$

.....

Wat jy in hierdie vraag doen word soms "vermenigvuldiging van 'n veelterm met 'n eenterm" genoem. Jy kan ook sê dat jy elke keer die uitdrukking **uitbrei**, of dat jy 'n ekwivalente uitdrukking in **uitgebreide vorm** skryf.

(g) $2x^2(3x^2 + 2)$

.....

(i) $-2x^4(x^3 - 2x^2 - 4x + 5)$

.....

(k) $x^2y^3(3x^2y + xy^2 - y)$

.....

(m) $2a^2b(3a^2 + 2a^2b^2 + 4b^2)$

.....

(h) $3x^3(2x^2 + 4x - 5)$

.....

(j) $a^2b(a^3 - a^2 + a + 1)$

.....

(l) $-2x(x^3 - y^3)$

.....

(n) $2ab^2(3a^3 - 1)$

.....

8. Brei die dele van elke uitdrukking uit en vereenvoudig. Evalueer dan die uitdrukking vir $x = 5$.

(a) $5(x - 2) + 3(x + 4)$

.....

(c) $x(x - 4) + 4(x - 4)$

.....

(e) $x(x^2 - 3x + 9) + 3(x^2 - 3x + 9)$

.....

(b) $x(x + 4) - 4(x + 4)$

.....

(d) $x(x^2 + 3x + 9) - 3(x^2 + 3x + 9)$

.....

(f) $x^2(x^2 - 3x + 4) - x(x^3 + 4x^2 + 2x + 3)$

.....

9. Skryf in uitgebreide vorm.

(a) $x(x^2 + 2xy + y^2) + y(x^2 + 2xy + y^2)$

.....

(b) $x^2y(x^2 - 2xy + y^2) - xy^2(2x^2 - 3xy - y^2)$

.....

(c) $ab^2c(b^2c^2 - ac) + b^2c^4(a^2 + abc^2)$

.....

(d) $p^2q(pq^2 + p + q) + pq(p - q^2)$

.....

KWADRATE EN DERDEMAGTE EN WORTELS VAN EENTERME

1. Evalueer elk van die volgende uitdrukkings vir $x = 2$, $x = 5$ en $x = 10$.

(a) $(3x)^2$

(b) $9x^2$

.....

(c) $(2x)^2$

(d) $4x^2$

.....

(e) $(2x)^3$

(f) $8x^3$

.....

(g) $(2x + 3x)^2$

(h) $(10x - 7x)^2$

.....

2. Skryf 'n ekwivalente eenterm sonder hakies.

(a) $(5x)^2$

(b) $(5x)^3$

.....

(c) $(20x)^2$

(d) $(10x)^3$

.....

(e) $(2x + 7x)^2$

(f) $(20x - 13x)^3$

.....

Die vierkantswortel van $16x^2$ is $4x$, want $(4x)^2 = 16x^2$.

3. Skryf die vierkantswortel van elk van die volgende uitdrukkings neer.

(a) $\sqrt{(7x)^2}$

(b) $\sqrt{9x^2}$

.....

(c) $\sqrt{(20x)^2}$

(d) $\sqrt{100x^2}$

.....

(e) $\sqrt{(20x - 15x)^2}$

(f) $\sqrt{25x^2}$

(g) $\sqrt{(21x - 16x)^2}$

(h) $\sqrt{(5x)^2}$

Die derdemagwortel van $64x^3$ is $4x$, want $(4x)^3 = 64x^3$.

4. Skryf die derdemagwortel van elk van die volgende uitdrukkings neer:

(a) $\sqrt[3]{(7x)^3}$

(b) $\sqrt[3]{27x^3}$

(c) $\sqrt[3]{(20x)^3}$

(d) $\sqrt[3]{1\,000x^3}$

(e) $\sqrt[3]{(20x - 15x)^3}$

(f) $\sqrt[3]{125x^3}$

8.5 Deel veelterme deur heelgetalle en eenterme

1. Voltooi die tabel.

x	20	10	5	-5	-10	-20
$(100x - 5x^2) \div 5x$						
$20 - x$						

Kan jy jou waarnemings verduidelik?

2. (a) R240 prysgeld moet gelykop tussen 20 netbalspelers verdeel word.

Hoeveel moet elke speler kry?

(b) Mpho het besluit om die volgende berekening te doen: $(140 \div 20) + (100 \div 20)$.

Moenie Mpho se berekening doen nie, maar dink hieroor:

Sal Mpho dieselfde antwoord kry wat jy vir vraag (a) gekry het?

(c) Gert het besluit om die volgende berekening te doen: $(240 \div 12) + (240 \div 8)$.

Sonder om die berekening te doen, sê of Gert dieselfde antwoord sal kry wat jy vir vraag (a) gekry het.

3. Doen die nodige berekeninge om uit te vind of die volgende stellings waar of onwaar is:

(a) $(140 + 100) \div 20 = (140 \div 20) + (100 \div 20)$

.....

(b) $240 \div (12 + 8) = (240 \div 12) + (240 \div 8)$

.....

(c) $(300 - 60) \div 20 = (300 \div 20) - (60 \div 20)$

.....

Deling is **regs-distributief** oor optel en aftrek, byvoorbeeld $(2 + 3) \div 5 = (2 \div 5) + (3 \div 5)$. Die deeltteken is regs van die hakies. Maar deling is nie links-distributief nie, byvoorbeeld $10 \div (2 + 4) \neq (10 \div 2) + (10 \div 4)$.

Nog voorbeelde: $(200 + 40) \div 20 = (200 \div 20) + (40 \div 20) = 10 + 2 = 12$, en $(500 + 200 - 300) \div 50 = (500 \div 50) + (200 \div 50) - (300 \div 50)$

4. Evalueer elke uitdrukking vir $x = 2$ en $x = 10$.

(a) $(10x^2 + 5x) \div 5$ (b) $(10x^2 \div 5) + (5x \div 5)$

.....

(c) $2x^2 + x$ (d) $(10x^2 + 5x) \div 5x$

.....

(e) $(10x^2 \div 5x) + (5x \div 5x)$ (f) $2x + 1$

.....

Die verspreidingseienskap van deling kan soos volg uitgedruk word:

$(x + y) \div z = (x \div z) + (y \div z)$

$(x - y) \div z = (x \div z) - (y \div z)$

5. (a) Moenie enige berekeninge doen nie. Watter van die volgende uitdrukkings *dink* jy sal dieselfde waarde as $(10x^2 + 20x - 15) \div 5$, vir $x = 10$ sowel as $x = 2$ hê?

$2x^2 + 20x - 15$ $10x^2 + 20x - 3$ $2x^2 + 4x - 3$

(b) Doen die nodige berekeninge om jou antwoord te kontroleer.

.....

6. Vereenvoudig:

(a) $(2x + 2y) \div 2$

(b) $(4x + 8y) \div 4$

(c) $(20xy + 16x) \div 4x$

(d) $(42x - 6) \div 6$

(e) $(28x^4 - 7x^3 + x^2) \div x^2$

(f) $(24x^2 + 16x) \div 8x$

(g) $(30x^2 - 24x) \div 3x$

7. Vereenvoudig:

(a) $(9x^2 + xy) \div xy$

(b) $(48a - 30ab + 16ab^2) \div 2a$

(c) $(3a^3 + a^2) \div a^2$

(d) $(13a - 17ab) \div a$

(e) $(3a^2 + 5a^3) \div a$

(f) $(39a^2b + 13ab + ab^2) \div ab$

Die instruksie $72 \div 6$ kan ook as $\frac{72}{6}$ geskryf word.

Hierdie skryfwyse, wat net soos die skryfwyse vir gewone breuke lyk, word dikwels gebruik om deling aan te dui.

In plaas van $(10x^2 + 20x - 15) \div 5$ kan ons dus $\frac{10x^2 + 20x - 15}{5}$ skryf.

Aangesien $(10x^2 + 20x - 15) \div 5$ ekwivalent is aan $(10x^2 \div 5) + (20x \div 5) - (15 \div 5)$, is $\frac{10x^2 + 20x - 15}{5}$ ekwivalent aan $\frac{10x^2}{5} + \frac{20x}{5} - \frac{15}{5}$.

8. Vind 'n eenvoudiger ekwivalente uitdrukking vir elk van die volgende uitdrukkings (hierdie uitdrukkings maak duidelik nie sin as $x = 0$ nie).

(a) $\frac{16x^2 - 12x}{4x}$

(b) $\frac{16x^3 - 12x}{4x}$

(c) $\frac{16x^3 - 12x^2}{4x}$

(d) $\frac{16x^3 - 12x^2}{4x^2}$

(e) $\frac{16x^3 - 12x^2}{2x}$

(f) $\frac{16x^3 - 12x}{8x}$

9. Kontroleer of elk van die volgende stellings waar is vir $x = 10$; $x = 100$; $x = 5$; $x = 1$ en $x = -2$.

- (a) $\frac{x^2}{x} = x$ (b) $\frac{x^3}{x} = x^2$ (c) $\frac{x^3}{x^2} = x$
 (d) $\frac{5x^3}{x} = 5x^2$ (e) $\frac{5x^3}{x} = 5^3$
 (f) $\frac{5x}{x^2} = \frac{5}{x}$

10. (a) Verduidelik waarom $\frac{100x - 5x^2}{5x} = 20 - x$ vir alle waardes van x behalwe $x = 0$.

.....

(b) Verduidelik waarom $\frac{15x^2 - 10x}{5x}$ ekwivalent is aan $3x - 2$, behalwe as $x = 0$.

.....

11. Voltooi die tabel. (Wenk: Vereenvoudig eers die uitdrukkings om dinge vir jouself makliker te maak!)

x	1,5	2,8	-3,1	0,72
$\frac{3x + 12}{3}$				
$\frac{18x^2 + 6}{6}$				
$\frac{5x^2 + 7x}{x}$				

12. Vereenvoudig elke uitdrukking tot die ekwivalente vorm wat so min as moontlik bewerkings sal vereis.

- (a) $\frac{3a + a^2}{a}$ (b) $\frac{x^3 + 2x^2 - x}{x}$ (c) $\frac{2a + 12ab}{2a}$
 (d) $\frac{12x^2 + 10x}{2x}$ (e) $\frac{21ab - 14a^2}{7a}$ (f) $\frac{15a^2b + 30ab^2}{5ab}$
 (g) $\frac{7x^3 + 21x^2}{7x^2}$ (h) $\frac{3x^2 + 9x}{3x}$

13. Los die vergelykings op.

- (a) $\frac{3x^2 + 15x}{3x} = 20$ (b) $\frac{30x - 18x^2}{6x} = 2$

.....

.....

14. Voltooi die tabel.

	x	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
(a)	$\frac{x^3 + 2x^2 - x}{x}$					
(b)	$\frac{7x^3 + 21x^2}{7x^2}$					
(c)	$\frac{50x^2 + 5x}{5x}$					

15. Vereenvoudig die volgende uitdrukkings.

(a) $\frac{3x(5x + 4) + 6x(5x + 3)}{5x}$

(b) $\frac{14x^2 - 28x}{7x} + \frac{24x - 18x^2}{3x}$

.....

.....

.....

8.6 Produkte en kwadrate van tweeterme

Hoe kan ons die uitgebreide vorm van $(x + 2)(x + 3)$ bepaal?

Om $(x + 2)(x + 3)$ uit te brei, kan jy eers $(x + 2)$ hou soos dit is en die verspreidingseienskap toepas:

$$\begin{aligned} &(x + 2)(x + 3) \\ &= (x + 2)x + (x + 2)3 \\ &= x^2 + 2x + 3x + 6 \\ &= x^2 + 5x + 6 \end{aligned}$$

1. Beskryf hoe jy kan kontroleer of $(x + 2)(x + 3)$ werklik ekwivalent is aan $x^2 + 5x + 6$.

.....

.....

Om $(x - y)(x + 3y)$ uit te brei kan dit as $(x - y)x + (x - y)3y$ geskryf word en die twee dele kan dan verder uitgebrei word.

$$\begin{aligned} &(x - y)(x + 3y) \\ &= (x - y)x + (x - y)3y \\ &= x^2 - xy + 3xy - 3y^2 \\ &= x^2 + 2xy - 3y^2 \end{aligned}$$

2. Doen 'n paar berekeninge om te kontroleer of $(x - y)(x + 3y)$ en $x^2 + 2xy - 3y^2$ ekwivalent is. Skryf die resultate van jou berekeninge in die tabel.

x					
y					

3. Brei elkeen van hierdie uitdrukkings uit.

(a) $(x + 3)(x + 4)$

.....

(b) $(x + 3)(4 - x)$

.....

(c) $(x + 3)(x - 5)$

.....

(d) $(2x^2 + 1)(3x - 4)$

.....

(e) $(x + y)(x + 2y)$

.....

(f) $(a - b)(2a + 3b)$

.....

(g) $(k^2 + m)(k^2 + 2m)$

.....

(h) $(2x + 3)(2x - 3)$

.....

(i) $(5x + 2)(5x - 2)$

.....

(j) $(ax - by)(ax + by)$

.....

4. Brei elkeen van hierdie uitdrukkings uit.

(a) $(a + b)(a + b)$

.....

(b) $(a - b)(a - b)$

.....

(c) $(x + y)(x + y)$

(d) $(x - y)(x - y)$

.....
(e) $(2a + 3b)(2a + 3b)$

.....
(f) $(2a - 3b)(2a - 3b)$

.....
(g) $(5x + 2y)(5x + 2y)$

.....
(h) $(5x - 2y)(5x - 2y)$

.....
(i) $(ax + b)(ax + b)$

.....
(j) $(ax - b)(ax - b)$

5. Kan jy raai wat die antwoord op elk van die volgende vrae sal wees sonder om dit uit te werk soos jy in vraag 3 gemaak het? Probeer dit en kontroleer dan jou antwoorde. Brei hierdie uitdrukkings uit:

(a) $(m + n)(m + n)$

(b) $(m - n)(m - n)$

.....
(c) $(3x + 2y)(3x + 2y)$

.....
(d) $(3x - 2y)(3x - 2y)$

Al die uitdrukkings in vraag 4 en 5 is **kwadrate van tweeterme**, byvoorbeeld $(ax + b)^2$ en $(ax - b)^2$.

6. Brei uit:

(a) $(ax + b)^2$

(b) $(ax - b)^2$

.....
(c) $(2s + 5)^2$

.....
(d) $(2s - 5)^2$

.....
(e) $(ax + by)^2$

.....
(f) $(ax - by)^2$

.....
(g) $(2s + 5r)^2$

.....
(h) $(2s - 5r)^2$

7. Brei uit en vereenvoudig.

(a) $(4x + 3)(6x + 4) + (3x + 2)(8x + 5)$

.....
(b) $(4x + 3)(6x + 4) - (3x + 2)(8x + 5)$

8.7 Vervanging in algebraïese uitdrukkings

1. In vraag 2 moet jy die waardes van verskillende uitdrukkings vir 'n paar gegewe waardes van x bepaal. Kyk mooi na die verskillende uitdrukkings in die tabel. Dink jy party van hulle kan dalk ekwivalent wees? Vereenvoudig die langer uitdrukking en kyk of jy die korter uitdrukking kry.

2. Voltooi die tabel.

	x	13	-13	2,5	10
(a)	$(2x + 3)(3x - 5)$				
(b)	$10x^2 + 5x - 7 + 3x^2 - 4x - 3$				
(c)	$3(10x^2 - 5x + 2) - 5x(6x - 4)$				
(d)	$13x^2 + x - 10$				
(e)	$6x^2 - x - 15$				
(f)	$5x + 6$				

3. Voltooi hierdie tabel.

	x	1	2	3	4
(a)	$(2x + 3)(5x - 3) + (10x + 9)(1 - x)$				
(b)	$\frac{9x^2 + 30x}{3x}$				
(c)	$3x(10x - 5) - 5x(6x - 4)$				
(d)	$5x(4x + 3) - 2x(7 + 13x) + 2x(3x + 2)$				

4. Beskryf enige patrone wat jy in jou antwoorde vir vraag 3 raaksien.

.....

5. Voltooi hierdie tabel.

	x	1,5	2,5	3,5	4,5
(a)	$(2x + 3)(5x - 3) + (10x + 9)(1 - x)$				
(b)	$\frac{9x^2 + 30x}{3x}$				
(c)	$3x(10x - 5) - 5x(6x - 4)$				
(d)	$5x(4x + 3) - 2x(7 + 13x) + 2x(3x + 2)$				


HOOFSTUK 9

Vergelykings

In hierdie hoofstuk sal jy na getalle soek wat bewerings waar maak. Dit word die oplossing van vergelykings genoem. Jy sal vergelykings op twee verskillende maniere oplos, naamlik deur inspeksie en deur hulle 'om te keer'.

Jy sal vind dat twee vergelykings dieselfde oplossing kan hê. Sulke vergelykings word ekwivalente vergelykings genoem. Jy sal ook ontdek dat nie alle bewerings algebraïese vergelykings is nie. Sommige bewerings is algebraïese identiteite en ander is in werklikheid algebraïese onmoontlikhede. Jy sal leer wat die verskil tussen hierdie drie tipes bewerings is.

9.1	Los vergelykings op deur inspeksie	145
9.2	Los vergelykings op deur optellings- en vermenigvuldigingsinverses te gebruik.....	146
9.3	Stel vergelykings op	148
9.4	Vergelykings en situasies.....	151
9.5	Los vergelykings op deur die eienskappe van eksponente te gebruik	153



9 Vergelykings

9.1 Los vergelykings op deur inspeksie

1. Ses vergelykings is onder die tabel gegee. Gebruik die tabel om uit te vind vir watter van die gegewe waardes van x dit waar sal wees dat die linkerkant van die vergelyking gelyk is aan die regterkant.

Om die oplossing van 'n vergelyking te soek deur tabelle te gebruik, word **oplossing deur inspeksie** genoem.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$2x + 3$	-3	-1	1	3	5	7	9	11
$x + 4$	1	2	3	4	5	6	7	8
$9 - x$	12	11	10	9	8	7	6	5
$3x - 2$	-11	-8	-5	-2	1	4	7	10
$10x - 7$	-37	-27	-17	-7	3	13	23	33
$5x + 3$	-12	-7	-2	3	8	13	18	23
$10 - 3x$	19	16	13	10	7	4	1	-2

(a) $2x + 3 = 5x + 3$

(b) $5x + 3 = 9 - x$

.....

(c) $2x + 3 = x + 4$

(d) $10x - 7 = 5x + 3$

.....

(e) $3x - 2 = x + 4$

(f) $9 - x = 2x + 3$

.....

Twee vergelykings kan dieselfde oplossing hê. $5x = 10$ en $x + 2 = 4$ het byvoorbeeld dieselfde oplossing; $x = 2$ is die oplossing vir albei vergelykings.

Twee vergelykings word **ekwivalent** genoem as hulle dieselfde oplossing het.

2. Watter van die vergelykings in vraag 1 het dieselfde oplossing? Verduidelik.

.....

.....

9.2 Los vergelykings op deur optellings- en vermenigvuldigingsinverses te gebruik


1. Bepaal die waarde van x .

(a) $x \rightarrow \boxed{+ 7} \rightarrow 10$


(b) $x \rightarrow \boxed{\times 2} \rightarrow \boxed{+ 3} \rightarrow 13$

.....

2. Voltooi die vloeiagramme. Jy moet al die ontbrekende getalle invul.



Om die tweede invoergetal te kry, kan jy vir jouself sê: "Nadat ek 7 bygetel het, het ek 12 gehad. Wat het ek gehad voordat ek 7 bygetel het?"




Om die invoergetal te kry wat met 13 ooreenstem, kan jy jouself afvra: "Wat het ek gehad voordat ek 3 bygetel het?" En dan: "Wat het ek gehad voordat ek met 2 vermenigvuldig het?"

3. Gebruik jou antwoorde vir vraag 2 om jou antwoorde vir vraag 1 te kontroleer.

4. Beskryf die instruksies in vloeiagram 2(b) in woorde en ook met 'n uitdrukking in simbole.

.....

5. Voltooi die vloeiagram.



Hierdie vloeiagram word die **inverse** van die vloeiagram in vraag 2(b) genoem.

6. Vergelyk die invoergetalle en die uitvoergetalle van die vloediagramme in vraag 2(b) en vraag 5. Wat merk jy op?

.....

7. (a) Tel 5 by enige getal en trek dan 5 van jou antwoord af. Wat kry jy?

.....

(b) Vermenigvuldig enige getal met 10 en deel dan die antwoord deur 10. Wat kry jy?

.....

As jy 'n getal bytel en dan dieselfde getal aftrek, is jy terug waar jy begin het. Dit is waarom optel en aftrek **inverse bewerkings** genoem word.

As jy met 'n getal vermenigvuldig en dan deur dieselfde getal deel, is jy terug waar jy begin het. Dit is waarom vermenigvuldiging en deling **inverse bewerkings** genoem word.

Die uitdrukking $5x - 3$ sê “vermenigvuldig met 5 en trek dan 3 af”. Hierdie instruksie kan ook met 'n vloediagram gegee word: $\boxed{\times 5} \rightarrow \boxed{- 3} \rightarrow$

Die vergelyking $5x - 3 = 47$ kan ook as 'n vloediagram geskryf word:

$$\boxed{\times 5} \rightarrow \boxed{- 3} \rightarrow 47$$

8. Los die vergelykings hier onder op. Jy kan dit doen deur die inverse bewerkings te gebruik. Jy kan 'n vloediagram maak om jou te help om die bewerkings te sien.

(a) $2x + 5 = 23$

(b) $3x - 5 = 16$

.....

(c) $5x - 60 = -5$

(d) $\frac{1}{3}x + 11 = 19$

.....

(e) $10(x + 3) = 88$

(f) $2(x - 13) = 14$

.....

9.3 Stel vergelykings op

STEL VERGELYKINGS OP

Jy kan maklik 'n vergelyking opstel wat 5 as die oplossing het. Hier is 'n voorbeeld:

Begin deur die oplossing te skryf $x = 5$
Tel 3 aan albei kante by $x + 3 = 8$
Vermenigvuldig albei kante met 5 $5x + 15 = 40$

1. Wat is die oplossing van die vergelyking $5x + 15 = 40$?
2. Stel jou eie vergelyking op met die oplossing $x = 3$.

.....
.....
.....

3. Bongile het soos volg gewerk om die vergelyking $2(x + 8) = 30$ te maak, maar hy het 'n deel van sy werk uitgevee.

Begin deur die oplossing te skryf $x =$
Tel 8 aan albei kante by $= 15$
Vermenigvuldig albei kante met 2 $2(x + 8) = 30$

Voltooi Bongile se skryfwerk om die vergelyking $2(x + 8) = 30$ op te los.

4. Dit is hoe Bongile 'n moeiliker vergelyking gemaak het:

Begin deur die oplossing te skryf $x =$
Vermenigvuldig met 3 aan albei kante $3x =$
Trek 9 aan albei kante af $3x - 9 = 6$
Tel $2x$ aan albei kante by $5x - 9 = 2x + 6$

- (a) Wat was aan die regterkant voor Bongile 9 afgetrek het?
- (b) Wat is die oplossing van $5x - 9 = 2x + 6$?

5. Bongile het met 'n oplossing begin en met 'n vergelyking geëindig. Vul die stappe in wat Bongile gevolg het om die vergelyking op te stel en die vergelyking op te los:

$x =$
 $8x =$
 $8x + 3 =$
 $3x + 3 = 35 - 5x$

LOS VERGELYKINGS OP

Om 'n vergelyking op te stel, kan jy dieselfde bewerking aan albei kante toepas.

Vermenigvuldig met 8
Tel 3 by
Trek $5x$ af



$$\begin{aligned} x &= 4 \\ 8x &= 32 \\ 8x + 3 &= 35 \\ 3x + 3 &= 35 - 5x \end{aligned}$$



Om 'n vergelyking op te los, kan jy die inverse bewerking aan albei kante toepas.

Deel deur 8
Trek 3 af
Tel $5x$ by

Gebruik enige toepaslike metode om die vergelykings hier onder op te los.

1. (a) $5x + 3 = 24 - 2x$

(b) $2x + 4 = -9$

.....
.....
.....

(c) $3 - x = x - 3$

(d) $6(2x + 1) = 0$

.....
.....
.....

2. (a) $4(1 - 2x) = 12 - 7x$

(b) $8(1 - 3x) = 5(4x + 6)$

.....
.....
.....

(c) $7x - 10 = 3x + 7$

(d) $1,6x + 7 = 3,5x + 3,2$

.....
.....
.....

GETALPATRONE EN VERGELYKINGS

1. (a) Watter van die volgende reëls sal die getalpatroon oplewer wat in die tweede ry van die tabel hier onder gegee word?
- A. Termwaarde = $8n$ waar n die termnommer is
 - B. Termwaarde = $6n - 1$ waar n die termnommer is
 - C. Termwaarde = $6n + 2$ waar n die termnommer is
 - D. Termwaarde = $10n - 2$ waar n die termnommer is
 - E. Termwaarde = $5n + 3$ waar n die termnommer is

.....

Termnommer	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termwaarde	8	13	18	23	28	33	38	43	48

- (b) Die sesde term van die ry het die waarde 33. Watter term sal die waarde 143 hê? Jy kan 'n vergelyking opstel en oplos om uit te vind.

-
- (c) Pas reël E op jou antwoord toe om te kontroleer of jou antwoord korrek is.
-

2. (a) Skryf die reël neer wat die getalpatroon in die tweede ry van hierdie tabel sal oplewer. Jy sal dalk 'n bietjie moet eksperimenteer om uit te vind wat die reël is.

Termnommer	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termwaarde	5	8	11	14	17	20	23	26	29

-
- (b) Watter term sal die waarde 221 hê?
-

3. Die reël vir getalpatroon A is $4n + 11$ en die reël vir patroon B is $7n - 34$.

- (a) Voltooi die tabel vir die twee patrone.

Termnommer	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Patroon A									
Patroon B									

- (b) Vir watter waarde van n is die terme van die twee patrone gelyk?
-

9.4 Vergelykings en situasies

1. Beskou hierdie situasie.

Om 'n kamer in 'n sekere gebou te huur, moet jy 'n deposito van R400 betaal en dan R80 per dag.

- (a) Hoeveel geld het jy nodig om die kamer vir 10 dae te huur?

.....

- (b) Hoeveel geld het jy nodig om die kamer vir 15 dae te huur?

.....

2. Watter van die volgende beskryf die metode wat jy gebruik het om vraag 1(a) en (b) te beantwoord die beste? Onderstreep dit.

- A. Totale koste = R400 + R80
B. Totale koste = 400(getal dae + 80)
C. Totale koste = 80 × getal dae + 400
D. Totale koste = (80 + 400) × getal dae

3. Vir hoeveel dae kan jy die kamer wat in vraag 1 beskryf is huur, as jy R2 800 het?

.....

.....

.....

As jy wil weet vir hoeveel dae jy die kamer kan huur as jy R720 het, kan jy 'n vergelyking opstel en dit oplos:

Jy weet die totale koste is R720 en jy weet dat jy die totale koste soos volg kan uitwerk:

Totale koste = $80x + 400$, waar x die getal dae is. Dus $80x + 400 = 720$ en $x = 4$ dae.

Bepaal in elkeen van die volgende gevalle die onbekende getal deur 'n vergelyking op te stel en dit op te los.

4. Om 'n sekere kamer te huur, moet jy 'n deposito van R300 betaal en dan R120 per dag.

- (a) Vir hoeveel dae kan jy die kamer huur as jy 'n totaal van R1 740 kan betaal? (As jy sukkel om die vergelyking op te stel, mag dit jou help om eers te besluit hoe jy sal uitwerk wat dit sal kos om die kamer vir 6 dae te huur.)

.....

.....

(b) Wat sal dit kos om die kamer vir 10 dae, vir 11 dae en vir 12 dae te huur?

.....
.....
.....

(c) Vir hoeveel dae kan jy die kamer huur as jy R3 300 beskikbaar het?

.....
.....
.....

(d) Vir hoeveel dae kan jy die kamer huur as jy R3 000 beskikbaar het?

.....
.....
.....

5. Ben en Thabo besluit om 'n paar berekeninge met 'n bepaalde getal te doen. Ben vermenigvuldig die getal met 5 en tel 12 by. Thabo kry dieselfde antwoord as Ben wanneer hy die getal met 9 vermenigvuldig en 16 aftrek. Wat is die getal waarmee hulle gewerk het?

.....

6. Die koste om 'n bepaalde motor vir 'n tydperk van x dae te huur, kan met die volgende formule bereken word: $\text{Huurkoste in rand} = 260x + 310$
Watter inligting oor die huur van die motor sal jy kry as jy die volgende vergelyking oplos? $260x + 310 = 2\,910$

.....
.....

7. Sarah het 'n deposito van R320 vir 'n stalletjie by 'n mark betaal en sy betaal ook R70 per dag huur vir die stalletjie. Sy verkoop vrugte en groente by die stalletjie en stel vas dat sy elke dag ongeveer R150 wins kan maak. Na hoeveel dae sal sy soveel verdien het as wat sy in totaal vir die stalletjie betaal het?

.....
.....

9.5 Los vergelykings op deur die eienskappe van eksponente te gebruik

Jy moet dalk terugblaai na Hoofstuk 5 om jou geheue oor die eienskappe van eksponente te verfris.

Een tipe eksponensiële vergelyking waarmee jy in Graad 9 te doen het, het een of meer terme met 'n grondtal wat verhef word tot 'n mag wat 'n veranderlike bevat.

Voorbeeld: $2^x = 16$

Wanneer ons die onbekende waarde moet bepaal, vra ons die vraag: **“Tot watter mag moet die grondtal verhef word sodat die bewering waar is?”**

Voorbeeld: $2^x = 16$ Maak seker dat die terme met x op hul eie aan een kant is.

$2^x = 2^4$ Skryf die bekende term met dieselfde grondtal as die term met die eksponent.

$x = 4$ Stel die eksponente gelyk.

In die voorbeeld hier bo kan ons die eksponente gelykstel omdat die twee getalle gelyk is slegs wanneer hulle tot dieselfde mag verhef word.

1. Los op vir x :

(a) $5^{x-1} = 125$

(b) $2^{x+3} = 8$

.....

.....

(c) $10^x = 10\,000$

(d) $4^{x+2} = 64$

.....

.....

(e) $7^{x+1} = 1$

(f) $x^0 = 1$

.....

.....

Voorbeeld: Los op vir x : $3^x = \frac{1}{27}$

$3^x = 3^{-3}$ (Herskryf $\frac{1}{27}$ as 'n getal met grondtal 3.)

$x = -3$ (Stel die eksponente gelyk.)

2. Los op vir x .

(a) $7^x = \frac{1}{49}$

(b) $10^x = 0,001$

.....
.....
.....

(c) $6^x = \frac{1}{216}$

(d) $10^{x-1} = 0,001$

.....
.....
.....
.....

(e) $4^{-x} = \frac{1}{16}$

(f) $7^x = 7^{-3}$

.....
.....
.....

In 'n ander tipe vergelyking wat eksponente behels, is die veranderlike deel van die grondtal.

Voorbeeld: $x^5 = 32$

Wanneer ons die onbekende waarde moet bepaal, vra ons die vraag: **“Watter getal moet tot die gegewe mag verhef word sodat die bewering waar is?”**

Vir hierdie vergelykings moet jy onthou wat jy oor die magte van getalle soos 2, 3, 4, 5 en 10 weet.

LOS VERGELYKINGS OP MET 'N VERANDERLIKE IN DIE GRONDTAL

1. Voltooi die tabel en beantwoord die vrae wat volg:

	x	2	3	4	5
(a)	x^3	$2^3 = 8$			
(b)	x^5	$2^5 = 32$			
(c)	x^4	$2^4 = 16$			

Vir watter waarde van x is die volgende vergelykings waar?

- | | | |
|----------------|----------------|--------------------|
| (a) $x^3 = 64$ | (b) $x^5 = 32$ | (c) $x^4 = 256$ |
| | | |
| (d) $x^3 = 8$ | (e) $x^4 = 16$ | (f) $x^5 = 3\ 125$ |
| | | |

2. Los op vir x en gee 'n rede:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (a) $x^3 = 216$ | (b) $x^2 = 324$ |
| | |
| (c) $x^4 = 10\ 000$ | (d) $8^x = 512$ |
| | |
| (e) $18^x = 324$ | (f) $6^x = 216$ |
| | |

WERKBLAD

1. Ahmed het 'n getal met 5 vermenigvuldig, 3 by die antwoord getel en toe die getal waarmee hy begin het afgetrek. Die antwoord was 11. Met watter getal het hy begin?

.....
.....
.....

2. Gebruik enige gepaste metode om die vergelykings op te los.

(a) $3(x - 2) = 4(x + 1)$

(b) $5(x + 2) = -3(2 - x)$

.....
.....
.....
.....

(c) $1,5x = 0,7x - 24$

(d) $5(x + 3) = 5x + 12$

.....
.....
.....

(e) $2,5x = 0,5(x + 10)$

(f) $7(x - 2) = 7(2 - x)$

.....
.....
.....

(g) $\frac{1}{2}(2x - 3) = 5$

(h) $2x - 3(3 + x) = 5x + 9$

.....
.....
.....
.....

VERGELYKINGS

KWARTAAL 1

Hersiening en assessering


Hersiening	158
• Telgetalle	158
• Heelgetalle	160
• Breuke	161
• Die desimale notasie vir breuke.....	161
• Eksponente.....	162
• Patrone.....	163
• Funksies en verbande.....	165
• Algebraïese uitdrukkings.....	167
• Vergelykings	169
Assessering	170

Hersiening

Onthou om al die stappe in jou werk te wys.

TELGETALLE

1. Skryf al die getalle wat in die wolk voorkom in die tabel oor en plaas 'n regmerkie in al die getaltypekolomme waaraan die getal behoort. Die eerste getal is reeds as voorbeeld gedoen.



Getal- waarde	Getalgestelsel				
	Reële getalle	Natuurlike getalle	Heelgetalle	Rasionale getalle	Irrasionale getalle
-3	✓		✓	✓	

2. Die Ndlovu-gesin reis na die Kruger Nasionale Park vir 'n vakansie. Hier is 'n opsomming van hulle reis:

Tyd	Kilometerlesing	Beskrywing
06:12	123 564	Vertrek vanaf hul huis
08:32	123 785	Stop vir ontbyt en petrol
09:18	123 785	Vertrek vanaf vulstasie
11:34	124 011	Ruskamerstop
11:51	124 011	Vertrek vanaf vulstasie
13:32	124 175	Bereik Krugerhek

- (a) Bereken die getal ure wat die reis geduur het. Gee jou antwoord as 'n gemengde getal.

.....

(b) Bereken die gemiddelde spoed van die reis, afgerond tot een desimale plek.

.....

3. 'n Motor wat teen 'n gemiddelde spoed van 110 km/h reis, neem $2\frac{1}{4}$ uur om 'n reis te voltooi. Indien die terugreis binne 2 uur moet geskied, wat is die gemiddelde spoed wat gehandhaaf moet word?

.....

.....

4. As 4 blikkies vleis R75,80 kos, hoeveel sal 7 sulke blikkies vleis kos?

.....

.....

5. 'n Boer het genoeg hoendervoer om 300 hennes 20 dae lank te voer. Hoe lank sal dieselfde hoeveelheid voer hou voor dit opraak as hy nog 100 hennes sou bykoop?

.....

.....

6. Hoe lank sal dit R5 000 neem om te groei tot R5 900 as dit belê word teen 7,2% enkelvoudige rente per jaar?

.....

.....

7. Chardonnay wil 'n nuwe TV-stel wat R7 499 kos, koop. Sy het nie genoeg geld nie en oorweeg om dit op huurkoop te kry. Die winkel vra 'n deposito van 10% en dan gelyke maandelikse betalings van Rx vir 2 jaar. Indien die enkelvoudige rente wat op die rekening gehef word 15% is, bereken die waarde van x .

.....

.....

.....

.....

8. Hoeveel rente sal Tebogo kry as hy R12 500 deponeer vir 21 maande in 'n bankrekening wat 5,3% saamgestelde rente per jaar lewer?

.....

.....

.....

HEELGETALLE

Al die vrae in hierdie afdeling moet sonder 'n sakrekenaar gedoen word.

1. Skryf 'n getal in elke blokkie om die vergelykings waar te maak:

(a) + = -34

(b) - = -34


2. Hierdie vrae gaan oor getallerye. Vul die korrekte waardes in die blokkies in.

(a) 18; 10; 2;

(b) 2; -10; 50;

(c) -6 386; -6 392; -6 398;

3. Hier onder is 'n getallelyn. Die ontbrekende getal is presies halfpad tussen die ander twee getalle. Vul die korrekte waarde in die blokkie in.



4. Bereken die volgende:

(a) $28 - (-15)$

(b) $(-5)(12)(-7)$

.....

(c) $5 + 5 \times -6$

(d) $\frac{(\sqrt{81})(-2)^3}{-(-3)^2}$

.....

(e) $\frac{(-3)^2 \sqrt[3]{216}}{(-9)(-3)}$

.....

.....

5. Keiser Augustus het vanaf 27 v.C. tot 14 n.C. oor die Roomse Ryk geheers. Hoeveel jaar het hy regeer?

.....

.....

.....

BREUKE

Al die vrae in hierdie afdeling moet sonder 'n sakrekenaar gedoen word.

1. Vereenvoudig:

(a) $\sqrt{\frac{36}{81}x^8}$

(b) $\frac{5}{2}x^2 - \frac{5}{4}x^2$

.....

.....

(c) $(\frac{3}{4}xy^3)(\frac{4}{9}y)$

.....

.....

2. Vereenvoudig:

(a) $\frac{4x^{10}}{8x^5}$

(b) $\frac{5}{x} - \frac{1}{x}$

.....

.....

(c) $\frac{5x}{6y^2} \times \frac{3y}{15x}$

(d) $\frac{x+2}{4z^2} \div \frac{4(x+2)}{2z^3}$

.....

.....

DIE DESIMALE NOTASIE VIR BREUKE

Al die vrae in hierdie afdeling moet sonder 'n sakrekenaar gedoen word.

1. Bereken:

(a) $27,49 - 6,99$

(b) $0,03 \times 1,4$

(c) $1,44 \div 0,012$

.....

.....

2. Vereenvoudig:

(a) $\sqrt{0,04x^{16}}$

(b) $3,5x^2 - 4,6x^2$

(c) $(1,2x^2y^3)(5yx^2)$

.....

.....

3. Vereenvoudig:

(a) $\frac{0,2x^{15}}{0,01x^5}$

(b) $\frac{0,45}{x} - \frac{1,35}{x}$

.....

(c) $\frac{0,5x^3}{4,5y^2} \times \frac{3y}{2,5x}$

(d) $\frac{2,5x^3}{2y^2} \div \frac{0,5x}{0,03y^6}$

.....

EKSPONENTE

Al die vrae in hierdie afdeling moet sonder 'n sakrekenaar gedoen word, tensy anders gespesifiseer.

1. Skryf in wetenskaplike notasie:

(a) 2 500 001

(b) 0,0003045

.....

2. Skryf die getal $9,45 \times 10^{-5}$ in “gewone” notasie.

.....

3. Watter een van hierdie getalle is die grootste: $4,7 \times 10^{-9}$ of $5,12 \times 10^{-10}$?

.....

4. Bereken die volgende en gee jou antwoord in wetenskaplike notasie:

(a) $(5,9 \times 10^6) - (4,7 \times 10^6)$

(b) $(5,9 \times 10^6) + (4,7 \times 10^5)$

.....

(c) $(7,2 \times 10^{-4}) \times (2 \times 10^2)$

.....

5. Bereken die volgende en gee jou antwoord as 'n "gewone" desimale getal. Jy mag 'n sakrekenaar gebruik.

(a) $(6,3 \times 10^{-4}) - (1,9 \times 10^{-3})$

(b) $(5,8 \times 10^{-7}) \div (8 \times 10^{-11})$

.....

6. Vereenvoudig en skryf al die antwoorde met positiewe eksponente:

(a) 3^{-2}

(b) $2^7 \times 6^{-3} \times 3^2$

.....

(c) $\frac{2y^{-3}}{y^3}$

(d) $(2x^6)^{-3}$

.....

(e) $(2x^7)(2,5x^{-8})$

(f) $(-3a^2bc)^2(-5ac^{-2})$

.....

(g) $\frac{(2d^2e)^2}{(4d^{-3}e^2)^{-1}}$

.....

7. Los die vergelykings op:

(a) $3 \times 3^x = 81$

(b) $2^{x+1} = 0,125$

.....

.....

(c) $4^x + 10 = 74$

.....

.....

PATRONE

1. Vorm 'n getallery wat voldoen aan hierdie beskrywing: die eerste term is negatief, daarna word elke volgende term verkry deur die voorafgaande term te kwadreer en dan 10 af te trek. Skryf die eerste vier terme van die getallery neer.

.....

.....

2. Doen die volgende vir elk van die getallerye hier onder: (i) skryf die reël wat die verband tussen die terme in die ry beskryf in woorde neer, en (ii) gebruik die reël om die getallery met nog drie terme uit te brei.

(a) $-5; -2; 10; -20; \dots$

(b) $-4,5; -6,25; -8; \dots$

.....

3. In hierdie vraag word die reël waarvolgens elke term in die getallery bepaal word, gegee. In al die gevalle is n die term se posisie. Bepaal die eerste drie terme in elk van die getallerye:

(a) $3 - 5n$

(b) $2n^2 - 3n + 1$

.....

4. (a) Skryf die reël neer waarvolgens elke term van die getallery bepaal kan word. Doen dit in 'n formaat soortgelyk aan dié in vraag 3 gegee, waar n die posisie van die term is.

$-15; -12; -9; \dots$

.....




(b) Gebruik jou reël om die waarde van die 150ste term van die getallery te bepaal.

.....

5. Stel vas wat die patroon is en vul dan die ontbrekende waardes in die tabel in:

Posisie in getallery	1	2	3	4	5		10		
Termwaarde	2	5	10	17					226

6. Die prentjie hier onder wys 'n patroon wat met vuurhoutjies gebou is.



(a) Teken jou eie reeks vuurhoutjiepatrone waar daar 'n gemeenskaplike verskil tussen opeenvolgende figure is. Dit moet verskil van al die vuurhoutjiepatrone wat in hierdie hoofstuk en Hoofstuk 6 gewys is en dit moet die eerste drie vuurhoutjiepatrone in die reeks bevat.

(b) Skryf die reël neer wat die getal vuurhoutjies vir enige term kan bepaal.


.....

(c) Gebruik die reël om die ontbrekende waardes in die tabel in te vul.


Figuurnommer	4	5	6	7		50
Getal vuurhoutjies benodig						

FUNKSIES EN VERBANDE

1. (a) Gebruik die gegewe formule om die ontbrekende waardes van t te bepaal met die waardes van p wat gegee is:



- (b) Gebruik die gegewe formule om die ontbrekende invoerwaardes, p , en uitvoerwaardes, t , te bepaal.



2. Kyk na die waardes in die tabel hier onder:


x	-2	-1	0	1		4		12		
y	-4	-1	2	5						65

- (a) Skryf die reël om die y -waardes in die tabel te bepaal as 'n algebraïese formule in die vorm $y = ax + b$, waar a en b heelgetalle is.

.....

- (b) Gebruik die reël om die ontbrekende waardes in die tabel in te vul.

3. Kyk na hierdie grafiek:




(a) Voltooi die tabel deur die koördinate van punte van die grafiek af te lees:

x	-3	-2	-1	0	1	2
y						

(b) Skryf die algebraïese formule vir die grafiek in die vorm $y = \dots$

.....

(c) Voltooi die vloeiagram om die verband wat die grafiek illustreer voor te stel:



ALGEBRAÏESE UITDRUKKINGS

1. Vereenvoudig so ver as moontlik:

(a) $(2x^2 - 4x^2)^3$

.....

(b) $-2x^2(5x^3 - 3x^2 + 2x - 5)$

.....

(c) $(4b^2 - 7b^2)(5b^{-2} + 3b^{-1} - 7)$

.....

(d) $\frac{18x^2 - 12x + 2}{6x}$

.....
.....
.....

(e) $(2x + 5)(3x - 1)$

.....
.....

(f) $(4a - 3)^2$

.....
.....

(g) $\frac{6x^3 - 2(3x)(4x) + x}{4x^2}$

.....
.....
.....

2. Vereenvoudig so ver as moontlik:

(a) $4(a - 2b) - 5(3b + a)$

.....
.....

(b) $5 + 2(x^2 + 5x + 3)$

.....
.....

(c) $3x(2x^2 - 3x + 4) - 3(5 - 2x)$

.....
.....

(d) $(a + 3b - 2c) - (4a + b - c) - (2b - c + 3a)$

.....
.....

(e) $4(3x^2 + x - 2) - (x + 3)^2$

.....
.....

VERGELYKINGS

1. Los die volgende vergelykings op:

(a) $4 - 3x = -2$

(b) $4(2x - 1) = -8$

.....
.....
.....

(c) $2x + 1 = 3(2x - 1)$

(d) $(x + 2)(x - 4) = x^2 + 5x - 1$

.....
.....
.....

2. Thomas is z jaar oud en Tshilidzi is twee keer so oud soos Thomas. Die som van hul ouderdomme is 42.

(a) Skryf hierdie inligting neer as 'n vergelyking met die veranderlike z .

.....

(b) Los die vergelyking op om Tshilidzi se ouderdom te bepaal.

.....

3. Die basis van 'n driehoek is $(1,5x + 6)$ cm en die hoogte is 4 cm. Die oppervlakte van die driehoek is 24 cm^2 .

(a) Skryf hierdie inligting as 'n vergelyking in x neer.

.....

(b) Los die vergelyking op om die waarde van x te bepaal.

.....

.....

.....

(c) Hoe lank is die basis van die driehoek?

.....

.....

4. Los op vir x :

(a) $3^x = 9$

(b) $2^{x+1} = 16$

.....

.....

.....

Assessering

In hierdie afdeling dui die getalle tussen hakies aan die einde van 'n vraag aan hoeveel punte die vraag werd is. Gebruik hierdie inligting om te bepaal hoeveel werk nodig is by elke vraag. Die totale getal punte vir hierdie assessering is 75.

1. Gareth het die volgende getalle geklassifiseer:

Getalwaarde	Getalgestelsel				
	Reële getalle	Natuurlike getalle	Heelgetalle	Rasionale getalle	Irrasionale getalle
-1,5	✓		✓	✓	
$\sqrt{2}$	✓			✓	

(a) Gareth het 'n paar foute gemaak. Voltooi die volgende tabel deur die merkies in die korrekte blokkies te maak: (2)

Getalwaarde	Getalgestelsel				
	Reële getalle	Natuurlike getalle	Heelgetalle	Rasionale getalle	Irrasionale getalle
-1,5					
$\sqrt{2}$					

(b) Verduidelik hoekom jy jou veranderings aangebring het. (2)

.....

2. Pheto het R1 500 vir 2 jaar in 'n bankrekening belê. Aan die einde van die tydperk het sy aanvanklike belegging gegroei tot R1 717,50. Watter enkelvoudige rentekoers het die bank aan hom gegee? (Neem aan dat die rentekoers nie gedurende die tydperk aangepas is nie). Gee jou antwoord as 'n persentasie. (3)

.....

3. 'n Bentiër het 2 500 bendollers omgesit in darsek toe hy die Klingon Ryk bereik het. Hy het 2 000 darsek gekry nadat 3% kommissie gehef is. Bepaal die bendoller: darsek wisselkoers. Skryf can die volgende sin oor en voltooi dit: "1 Klingon darsek = ___ bendoller". Die ontbrekende waarde moet afgerond word tot die derde desimaal. (3)

.....

4. Bereken die verskil tussen die hoogste punt op die aarde se oppervlak (Mt Everest: 8 848 m bo seespieël) en die diepste punt van die seabodem (die bodem van die Marianassloot, 10 994 m onder seespieël). (1)

.....

5. Skryf twee getalle neer wat 21 as antwoord gee as die een van die ander afgetrek word. Een van die getalle moet positief wees, en die ander een negatief. (2)

.....

6. (a) Wat is die waarde van $(-1)^{1\,000\,001}$? (1)

.....

- (b) Verduidelik hoe jy die antwoord in (a) kon kry sonder 'n sakrekenaar. (1)

.....

7. Vereenvoudig die volgende sonder 'n sakrekenaar. Wys al die stappe in jou werk:

(a) $\frac{5}{2}x - \frac{11}{4}x + 1,125x$ (2)

.....

(b) $\sqrt[3]{\frac{0,027x^7}{216x}}$ (4)

.....

(c) $\frac{0,4x}{10} \times \frac{20x}{0,03} \div \frac{8x^2}{5}$ (4)

.....

(d) $\frac{x}{4} + [8x(x+1) \times \frac{0,5}{x+1}]$ (5)

.....

8. Die middellyn van 'n koolstofatoom is 0,000000000154 meter. Skryf dit in wetenskaplike notasie. (2)

.....

9. Vereenvoudig die volgende (gebruik slegs positiewe eksponente in die antwoorde):

(a) $3^{-9} \times 3^4$ (b) $\frac{(3d^3e^2)^3}{(2d^{-4}e)^{-1}}$ (5)

.....

10. Los op vir x : $9^{2x-3} = 3^x$ (3)

.....

11. Kyk na die volgende getallery: 6 000; -1 500; 375; ...


(a) Brei dit met twee terme uit. (2)

.....

(b) Is die volgende reël korrek (n is die posisie van die term in die getallery):
 $6\,000(0,25)^{n-1}$? Verduidelik jou antwoord. (2)

.....

12. Die onderstaande figuur wys 'n vuurhoutjiepatroon.



- (a) Teken die vyfde diagram in die patroon op die rooster. (2)
- (b) Die eerste twee terme in die ry wat geskep is deur die getal vuurhoutjies in elke patroon te gebruik, is: 4; 11. Skryf die volgende drie terme in die getallery neer. (2)

.....

.....

- (c) Skryf die reël wat die verband tussen terme in die ry beskryf, in woorde. (2)

.....

.....

13. Kyk na die waardes in die tabel hier onder:


x	-2	-1	0	1		5		16		
y	-10	-3	-2	-1						7 998

- (a) Skryf die reël waarmee die y -waardes in die tabel bepaal word as 'n algebraïese formule. (Wenk: Kyk na die derdemagte van die getalle.) (2)

.....

- (b) Gebruik die reël om die tabel se ontbrekende waardes in te vul. (3)

14. Kyk na die volgende grafiek:



(a) Voltooi die tabel deur die koördinate van punte van die grafiek af te lees: (2)

x	-2	-1	0	1	2	3
y						

(b) Skryf 'n algebraïese formule vir die grafiek in die vorm $y = \dots$ (2)

.....

15. Vereenvoudig:

(a) $\frac{15 + x - 5x^2}{5x^2}$ (3)

.....

(b) $(3x + 1)(3x - 1)$ (2)

.....

(c) $4 - 3(2x + 3)^2$ (3)

.....

16. Los die volgende vergelykings op:

(a) $x^2 + 5x - 1 - x^2 - x + 3 = 3(x - 4)$ (4)

.....

(b) $2(2x + 3) = (3x - 1)(-2)$ (4)

.....
